

Rassenadvies gele en rode zaaiuien

Een gepast ras kiezen is perceelafhankelijk en dus maatwerk. Bespreek daarom met uw AR Plant-adviseur wat de beste strategie kan zijn. In onderstaande tabel zijn de rassen opgenomen die AR Plant adviseert.

		Bewaarperiode		
		Afland/Kort	Midden	Lang
Oogst-tijdstip	Vroeg	Hybing	Hypark - Red Rover	Centro
	Midden	Summit	Hytech - Hyway - Hybelle	Rockito - Red Tide
	Laat		Donna - Red Baron	Dormo - Viggo - Hyfive - Romy

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,6 en 4,0 eenheden te zaaien en bij rode uien tussen de 3,1 en 3,4 eenheden. Bij Priming kunt u \pm 10% minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quikstart** en **geprimed** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versneld/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting door bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting met **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistente!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusariumaantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Nu **Vydate** weggevallen is onderzoeken we al enkele jaren alternatieven als Nemguard en Nemater. Verwacht u een probleem met aaltjes of andere bodeminsecten bespreek de mogelijkheden op voorhand met uw AR Plant-adviseur.
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed en vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Dit verlaagt de kans op aantasting door de **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Door de inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.



groeï door kennis



AgruniekRijnvallei

0418-655944
plant@argroep.nl
www.argroep.nl

© CS - 11.23

Rassenadvies Zaaiuien

2024



“Mijn overzicht van alle uienrassen, met tips en teeltadvies.”

Teler Anne



groeï door kennis



AgruniekRijnvallei

Raseigenschappen en -opbrengsten op kleigrond

Ras	Zaadhuis	Vroegheid ¹	Vorm ²	Uniformiteit ³	Huidvastheidsindex ⁴	Hardheidsindex ⁵	Droegstofgehalte ⁶ (relatief)	Eénkernigheidsindex ⁷	Spruitrust ⁸	Netto-opbrengst 2017 t/m 2022 ⁹	
										ZW-NL	Midden-NL
Nation	Syn	7,9	1,8	2,5	99	93	95	71	5,8	95	100
Novista	TAK	7,5	1,9	2,5	97	89	99	54	5,8	92	90
SV 3557 ND	Sem	7,5	1,8	2,4	99	96	98	87	5,8	101	92
Hypark	DGS	7,3	1,9	2,6	98	93	97	84	5,4	99	101
Centro	Haz	7,1	1,9	2,4	99	96	100	79	5,5	100	97
Paradiso	Haz	7,0	1,8	2,6	101	112	103	74	5,9	96	96
Hybound	DGS	7,0	1,8	2,6	100	95	100	83	5,7	101	106
Bruce	TAK	6,8	2,0	2,7	99	94	104	57	5,9	99	93
Rockito	Sem	6,8	1,8	2,6	102	106	98	85	5,8	99	93
Firmo	Haz	6,6	1,8	2,4	100	107	103	67	5,7	94	91
Bossito	Sem	6,5	1,8	2,6	100	101	103	75	5,2	93	93
Hyroad	DGS	6,5	1,8	2,7	101	102	103	88	5,8	99	100
Klondike 4400	KBZ	6,5	1,9	2,4	99	98	101	62	5,4	98	96
Hybelle	DGS	6,4	1,9	2,6	99	97	99	83	5,4	103	108
Bingo	KBZ	6,4	1,9	2,3	100	91	102	64	5,2	97	101
Hyway	DGS	6,3	1,9	2,6	99	95	100	84	5,7	102	106
Motion	Syn	6,2	1,9	2,6	101	98	97	78	5,5	103	104
Dormo	Haz	6,2	1,9	2,6	101	113	101	78	5,7	96	100
Promotion	Syn	6,2	1,8	2,6	101	98	98	75	5,5	101	105
Donna	HoZ	5,9	1,8	2,2	100	93	99	85	5,4	105	108
Progression	Syn	5,8	1,8	2,6	102	111	103	79	5,6	94	96
Hyfive	DGS	5,6	1,7	2,6	101	102	101	85	5,5	105	102
Hystore	DGS	5,4	1,9	2,4	100	97	99	79	5,6	101	102
Delta Gigant ¹⁰	DSH	5,4	1,9	2,5	101	112	96	86	6,1	107	111
Hoza ¹⁰	HoZ	4,9	1,9	2,3	101	104	103	89	5,4	103	104


100 = ... ton/ha

63,0 63,0

¹ gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger. ² 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond - rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond - platrond. ³ 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm. ⁴ hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien. ⁵ hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁶ 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁷ percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar. ⁸ hoger cijfer = langere spruitrust. ⁹ opbrengst na korte bewaring (eind januari; Zand) c.q. lange bewaring (mei; Klei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen. ¹⁰ bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen.

Kwaliteits- en opbrengstindex

In onderstaande grafiek zijn de rassen afkomstig van de Uireka-rassenlijst ingedeeld op basis van opbrengst en kwaliteitseigenschappen.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu