

# Aanbevolen uienrassen

Hieronder kan u rassen terugvinden die wij adviseren op de zuidelijke zandgrond. CZAV heeft een breed assortiment en kan elk ras leveren.

## Vento

- Uitstekende Opbrengst +++
- Heel goede Hardheid +++
- Goede huidvastheid
- Vroeg ras
- All-round in de afzet

## Centro

- Heel hoge Opbrengst +++(+)
- Heel goede Hardheid +++
- Middenvroeg ras
- Goede huidvastheid
- Sterk wortelstelsel

## Paradiso

- Goede Opbrengst ++
- Zeer goede hardheid +++(+)
- Middenvroeg ras
- Uitstekende huidvastheid
- Krachtig loof

## Bestellen

Afhankelijk van uw situatie en grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden. Uw adviseur kan u hierbij helpen. Bestel uw geprimed uienzaad uiterlijk voor 1 december, zo voorkomt u teleurstellingen. **Besteld uienzaad kan niet retour.** Bestellen kan via uw buitendienstman of stuur een mail naar [Bestellen@CZAV.nl](mailto:Bestellen@CZAV.nl).

## Hyway

- Goede Opbrengst ++
- Goede Hardheid ++
- Redelijke Huidvastheid
- Goed wortelstel

## SV3557ND

- Uitstekende Opbrengst +++
- Heel goede Hardheid +++
- Zeer vroeg
- Gemiddelde huidvastheid
- Lange bewaring mogelijk

## Summit

- Goede Opbrengst ++
- Matige Hardheid +
- Vroeg ras
- Niet voor bewaring
- Groeikrachtige gronden

## Hyroad

- Goede Opbrengst ++
- Goede Hardheid ++
- Middenvroeg ras
- Goede huidvastheid
- Mooi van kleur

# Rassenadvies Zaaiuien Zandgrond

2024



*“Mijn overzicht  
van alle uienrassen,  
met tips en teeltadvies.”*

Teler Anne



groei door kennis



T 0113 62 90 00  
[www.czav.nl](http://www.czav.nl)

[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)

© CS - 11.23



groei door kennis

# Rassenkeuze zaaiuien

Het is van belang om bij de rassenkeuze rekening te houden met de vroegheid, kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar verschillende raskenmerken:

- Opbrengst
- Hardheid
- Natuurlijke spuitrust
- Bewaarbaarheid
- Huidvastheid
- Grondsoort

## Zaaien

Bij het zaaien kun je het best rekening houden met een veldopkomst van 90% en een kiemkracht van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad eenheden. Bij zaadvaste en late rassen kun je beter dikker zaaien, zodat het gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke vijf planten meer zaaien per m<sup>2</sup> (0,2 eenheid per ha), is één dag vroeger oogsten.

## Priming

Gepriemd uienzaad is voorgekiemd. Het zaad is op gang gebracht en op precies het juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje in vochtige grond wordt gezaaid, zal het kiemproces direct hervatten. De belangrijkste voordelen van gepriemd zaaizaad zijn:

- Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur.
- Gelijkmatische opkomst en afrijping, hierdoor is de onkruidbeheersing eenvoudiger uit te voeren en is de geoogste partij uien egalier.
- Door ongeremde beginontwikkeling is er minder risico op ziekten en plagen met name bij opkomst.

	Gele uien	Rode uien
Optimale zaaidichtheid	80 planten/m <sup>2</sup>	70 planten/m <sup>2</sup>
Standaard zaaiadvies	3,8 eenheden	3,3 eenheden
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai	3,6 eenheden	3,2 eenheden
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai	4,0 eenheden	3,4 eenheden
Priming onder standaard omstandigheden	3,5 eenheden	3,0 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaaibed en weersomstandigheden)	1,5 – 3,0 cm	

# Rassenadvies gele zaaiuien

Een gepast ras kiezen is perceelafhankelijk en dus maatwerk. Bespreek daarom met uw CZAV-adviseur wat de beste strategie kan zijn. In onderstaande tabel zijn de rassen opgenomen die CZAV adviseert.

		Bewaarperiode		
		Afland/Kort	Midden	Lang
Oogsttijdstip	Vroeg	SV3557ND – Hybing	Hypark – Vento	Centro
	Midden	Summit	Hytech – Hyway – Hybell – Hyroad	Paradiso – Rockito
	Laat		Donna	Dormo – Viggo – Hyfive

## Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,6 en 4,0 eenheden te zaaien en bij rode uien tussen de 3,1 en 3,4 eenheden. Bij Priming kunt u  $\pm$  10% minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quikstart** en **gepriemd** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versneld/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting door bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting met **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusariumaantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Nu de Vydate weggevallen is onderzoeken we al enkele jaren alternatieven als Nemguard en Nemater. Verwacht u een probleem met **aaltjes** of andere bodeminsecten bespreek de mogelijkheden op voorhand met uw CZAV-adviseur.
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed en vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Dit verlaagt de kans op aantasting door de **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Teelt u regelmatig granen en/of graszaad dan is er hogere kans op **ritnaaldenschade** o.a. in uien. Via de module 'Mijn kniptor monitor' op 'Mijn CZAV' krijgt u advies over het optimale tijdstip om de kniptor te bestrijden.
- Door de inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.

