

# Folioplus

# Calcium Xtra

**PFC 1 (C)(I)(b)(i):**

Enkelvoudige vloeibare anorganische macronutriënten meststof in oplossing

**Omschrijving meststof:**

N (Mg) meststof, 7 (+10)

**Samenstelling**

10,0% Nitraatstikstof ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ) oplosbaar in water (158 g/l)

17,0% Calciumoxide ( $\text{CaO}$ ) oplosbaar in water (269 g/l)

1,0% Zink (Zn) als nitraat, oplosbaar in water (16 g/l)

**PFC 1 (C)(I)(b)(i) :**

Engras liquide inorganique simple avec macronutriments sous forme de solution

**Description de l'engrais :**

Engrais N (Mg), 7 (+10)

**Composition**

10,0% Azote ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ) soluble dans l'eau (158 g/l)

17,0% Oxyde de calcium ( $\text{CaO}$ ) soluble dans l'eau (269 g/l)

1,0 % Zinc (Zn) sous forme de nitrate, soluble dans l'eau (16 g/l)



BLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE



Inh. 10L e (15,8 kg)



CE

# Foliplus

## Calcium Xtra



groei door kennis

CropSolutions  
Oostelijke Kanaalweg 5  
NL-4424 NC Wemeldinge  
Tel: +31 (0)113 629 000  
[www.cropsolutions.nl](http://www.cropsolutions.nl)

### Advies / Conseils

Gewas / Culture	Tijdstip van toediening / Moment d'administration	Dosering/ Dosage	Opmerkingen / Commentaires
Algemeen	Preventief aan stress	1,0 liter per ha	Minimaal 3 maal, interval 1-2 weken
Généralités	Prévent le stress	1,0 litre par ha	Minimum 3 fois, à 1-2 semaines d'intervalle
Aardappelen	Starten voor de eerste verdikking van de stolonen	1,0 liter per ha	3-5 maal, interval 7-14 dagen
Pommes de terre	Commencer avant le premier épaissement des stolons	1,0 litre par ha	3 à 5 fois, à 7-14 jours d'intervalle
Cichorei	Starten vanaf begin augustus	1,0-1,5 liter per ha	Max 3 bespuitingen met interval 12-14 dagen
Chicorée	À partir du début du mois d'août	1,0 à 1,5 litre par ha	Max 3 pulvérisations à 12-14 jours d'intervalle
Wortelen	Vanaf 3-4 bladeren	1,0 liter per ha	4-6 maal interval 10-14 dagen
Carotte	À partir de 3-4 feuilles	1,0 litre par hectare	4-6 fois, à 10-14 jours d'intervalle
(Hard)fruit	Vanaf begin bloei	1,0-2,5 liter/ha	3-6 bespuitingen, 14-21 dagen interval
Fruits (durs)	Dès le début de la floraison	1,0-2,5 litres par ha	3-6 pulvérisations, à 14-21 jours d'intervalle
Aardbei	Vanaf de eerste bloemknop tot eind seizoen	0,5-1,0 liter per ha	Interval 7-10 dagen
Fraise	Du premier bouton de fleur à la fin de la saison	0,5 à 1,0 litre par ha	À 7-10 jours d'intervalle



Calciumnitraat<sup>®</sup> (CAS: 15245-12-2)

<sup>1</sup> CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

### Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

### Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaart het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

### Veiligheidsaanbevelingen

- P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P280 - Beschermende kleding dragen.
- P301+P312 - NA INSLUKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts... raadplegen.
- P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

### Gevarenaanduidingen

- H302 - Schadelijk bij inslikken.
- H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



Nitrate de calcium<sup>®</sup> (CAS: 15245-12-2)

<sup>1</sup> CMC 1 : Substances et mélanges en tant que matière première

### Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- A utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvérer si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

### Conditions de stockage

- Conserver les engrains foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.



### Recommendations de sécurité

P264 - Na lever soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit.

P280 - Porter des vêtements de protection.

P301+P312 - APRÈS INGESTION : Si vous vous sentez mal, consultez un CENTRE ANTIPOISON/docteur/etc.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer.

P337+P313 - En cas d'irritation persistante des yeux : consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu/recipient dans une installation agréée d'élimination des déchets.

### Mentions de danger

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H318 - Provoque une grave irritation des yeux.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, avec des conséquences durables.