



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE

Foliplus

Stikstof Pro 28



PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Enkelvoudige vloeibare anorganische macronutriënten-
meststof op basis van een oplossing

Omschrijving meststof:

N meststof, 28

Samenstelling

28,0% Totaal Stikstof (N)

11,5% Ureumstikstof (N) (144 g/l)

16,5% Methyleenureum (N) (206 g/l)

Deze meststof bevat ureum dat ammoniak kan
uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden.

Door de methyleenureum vorm, wordt
vervluchtiging grotendeels voorkomen.

Inh. **15L** e (18,75 kg)



PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Engrais liquide inorganique à macronutriments
à base de solution unique

Description de l'engrais:

Engrais N, 28

Composition

28,0% Azote total (N)

11,5% Azote uréique (N) (144 g/l)

16,5% Méthylène-urée (N) (206 g/l)

Cet engrais contient de l'urée, qui peut émettre
de l'ammoniac et affecter la qualité de l'air.

Grâce à la forme méthylène-urée,
la volatilisation est largement évitée.



CE

Foliplus

Stikstof Pro 28

Advies / Advies

Gewas / Culture	Tijdstip van toediening / Moment d'administration	Dosering/ Dosage	Opmerkingen / Commentaires
Algemeen	Tijdens groeiseizoen	10,0-25,0 liter per ha	Bij tijdelijk stikstofgebrek, herhalen
Généralités	Pendant la période de croissance	10,0 à 25,0 litres par ha	Répéter, en cas de carence temporaire en azote
Aardappelen	Vanaf knolvulling	15,0-30,0 liter per ha	Regelmatig bijmengen met de ziektebespuitingen Niet mengen met herbiciden
Pommes de terre	Au moment où les tubercules commencent à croître	15,0 à 30,0 litres par ha	Mélanger régulièrement avec des pulvérisations contre les maladies. Ne pas mélanger avec des herbicides
Granen, mais	Direct voor of na de bloei	20,0-30,0 liter per ha	Aanvullen bij tekort. Ter verhoging van eiwitgehalte is Foliplus Protein beter geschikt
Céréales, mais	Immédiatement avant ou après la floraison	20,0 à 30,0 litres par ha	Compléter en cas de pénurie. Pour augmenter la teneur en protéines, Foliplus Protein est mieux adapté
Suikerbieten	Juli-september	10,0-20,0 liter per ha	Om groeiremming door tijdelijk stikstoftekort te voorkomen. Bij stressreactie in voorjaar Foliplus amino NPK gebruiken
Betterave sucrière	De juillet à septembre	10,0 à 20,0 litres par ha	Pour prévenir l'inhibition de la croissance due à une carence temporaire en azote. En cas de réaction de stress au printemps, utiliser Foliplus amino NPK
Hard- en zachtfruit	Tijdens seizoen en na de oogst	5,0-15,0 liter per ha	Ter correctie van de waarden, evt. herhalen
Fruits durs et mous	En cours de saison et après la récolte	5,0 à 15,0 litres par ha	Pour corriger les valeurs, répéter si nécessaire



Bestanddelen

Polyoxymethyleen¹ (CAS: 9011-05-6)

Ureum¹ (CAS: 57-13-6)

¹ CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstrijf bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.



Composants

Polyoxyméthylène¹ (CAS : 9011-05-6)

Urée¹ (CAS : 57-13-6)

¹ CMC 1 : Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- Ne pas mélanger avec du cuivre et des produits fortement alcalins.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Savioliife, Viale Lombardia, 29-46019, Viadana (IT)

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



groei door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge

Tel: +31 (0)113 629 000

www.cropsolutions.eu