

CropSeeds Bufferstroken en akkerranden

2024

*“Bufferstroken en akkerranden
versterken de functionele
biodiversiteit.”*

Teler Bart



groeï door kennis

Bufferstrook

Met een bufferstrook met kruiden zorgt u voor meer biodiversiteit en creëert u voedselbronnen voor natuurlijke vijanden. Om punten te scoren voor het huidige GLB heeft u minimaal van 1 juni tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die samenvalt met een verplichte bufferstrook vanuit het 7^{de} ActiePlan Nitraat. De bufferstrook is minimaal 3 meter breed en maximaal 12 meter breed. Minimaal 25% van de bufferstrook is bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemigen gewassen. U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.

U beweidt of oogst de bufferstrook ook niet. De bufferstrook hoeft dus niet elk jaar opnieuw te worden ingezaaid als er maar altijd 25% van de bufferstrook zichtbaar bestaat uit kruiden en vlinderbloemigen. U mag de bufferstrook wel beheren met maaien en afvoeren.

Groene Braak

Groene braak telt mee als eco-activiteit als er een oppervlakte wordt ingezaaid van minimaal 3 meter breed en is bedekt van 31 mei tot en met 31 augustus. U mag in het aanvraagjaar minimaal 9 maanden achter elkaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en (kunst)mest gebruiken

U mag niet beweiden en niet oogsten. Groene braak kan op verschillende manieren worden ingevuld, de meest praktische zijn:

- Klaver
- Agrarisch natuurmengsel
- Raketblad
- Gras
- Drachtplanten
- Tagetes Patula

Voor de zandgronden kan de inzaai van Tagetes Patula mogelijk interessant zijn, aangezien dit ook nog een positief effect heeft op de aaltjespopulatie. Voor kleigronden zullen specifieke groenbemestermengsels bruikbaar zijn, welke verderop in deze folder beschreven worden. Mengsels van groenbemesters moeten bestaan uit tenminste 3 drachtplanten.



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu

Advies assortiment eenjarige bufferstroken

Veel natuurlijke vijanden hebben een levensfase waarin ze nectar en pollen nodig hebben van bloemen. Verschillende bloemen trekken verschillende natuurlijke vijanden aan en bloeien op verschillende tijdstippen. We hebben zorgvuldig mengsels samengesteld die een lange bloeiperiode hebben, zodat de natuurlijke vijanden lange tijd voedsel hebben. Daarnaast trekken onze mengsels geen ziekten en plagen aan en zorgen ze niet voor opslag. Al onze mengsels voldoen aan de eisen van het GLB en 7^{de} AP en kunnen worden gezaaid op de bufferstrook. We hebben 3 soorten anti-luizen mengsels. Één voor zaai in het voorjaar, één voor zaai in het najaar en één zonder schermbloemige om geen wortelvlug aan te trekken. Zaaïen in het najaar heeft het voordeel dat het mengsel tijdig bloeit en over het algemeen is de onkruiddruk dan lager.

Vital earth complex

Samenstelling: Gingellikruid (10%)
Bladraap (1%), Facelia (5%), Zomerwikke (25%),
Boekweit (5%), Alexandrijnse Klaver (20%),
Lupine 16%, Japanse Haver (15%),
Gele Mosterd (3%)
Zaaitijdstip: Mei - Augustus
Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha

Vital earth biodiversiteit

Samenstelling: Bladrammens (20%),
Gele Mosterd (20%), Facelia (15%),
Inkarnaatklaver (15%), Esparcette (30%)
Zaaitijdstip: Mei - Augustus
Zaaihoeveelheid: 30 kg/ha

Bloemrijk 1

Samenstelling: Citroengele Honingklaver,
Wikken, Hardzwenkgras/roodzwenkgras,
Gele Kamille, Boekweit, Klaproos,
Wilde Korenbloem, Meisjesogen, Zonnebloem
(max. 1 meter hoog), Gipskruid, Luzerne,
Gekroonde Ganzebloem, Saffloer,
Cosmos Sensation, Hoofdjesgilia,
Gele Ganzebloem, Vlas, Groot Kaasjeskruid,
Zeep- of Koekruid
Zaaitijdstip: Maart - Juni
Zaaihoeveelheid: 16 kg/ha



Onze mengsels zijn zo samengesteld dat ze belangrijke natuurlijke vijanden als: parasitaire wespen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen en lieveheersbeestjes aantrekken.

Advies assortiment meerjarige bufferstroken

Natuurlijke vijanden hebben baat bij nectar en pollen van bloemen maar ook van een blijvende overwinteringsplek. Het voordeel van meerjarige mengsels is ook dat de bloemen vroeger bloeien dan eenjarige mengsels. We hebben mengsels samengesteld met meerdere soorten voor een lange bloeiperiode en ook met grassen tegen de onkruiddruk. Met slim maaibeheer kunt u meerdere jaren van de kruiden genieten en houdt u de onkruiddruk laag. Daarnaast trekken onze mengsels geen ziekten en plagen aan en zorgen ze niet voor opslag. Al onze mengsels voldoen aan de eisen van het GLB en 7^{de} AP en kunnen worden gezaaid op de bufferstrook.

CS meerjarig basis

Samenstelling: Luzerne (37%),
Engels Raaigras (21%), Rietzwenkgras (30%),
Rode klaver (8%), Witte klaver (4%)
Zaaitijdstip: April - Mei of
Augustus - September
Zaaihoeveelheid: 35 kg/ha

Bloemrijk 2

Samenstelling: Blauwe Lupine, Boekweit,
Dille, Hardzwenkgras/Roodzwenkgras,
Inkarnaatklaver, Klaproos, Korenbloem,
Margriet, Phacelia, Voederwikke
Zaaitijdstip: Maart - Juni
Zaaihoeveelheid: 32 kg/ha



“Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing.”

Adviseur Marieke



groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Advies assortiment Groene Braak

Groene braak is de ideale manier om de biodiversiteit op uw bedrijf te vergroten. Veel nuttige insecten hebben behoefte aan voeding door middel van pollen en nectar en een schuilplaats. Door middel van groene braak kunt u hier op uw bedrijf in voorzien. Voor percelen met een hoge onkruiddruk adviseren we gras of grasklaver om door maaien onkruid onder de duim te houden. Daarnaast hebben we mengsels voor groene braak die bestaan uit verschillende soorten voor een lange bloeiperiode en stimuleren ook een divers bodemleven. De soorten hebben verschillende wortel-systemen en zorgen voor een goede structuur van de bodem. Onze mengsels voldoen aan de eisen van het GLB.

U kunt ook zelf mengsels samenstellen uit de lijst van drachtplanten. Het mengsel moet dan bestaan uit ten minste 3 drachtplanten van de volgende soorten: Karwij, Koriander, Wilde Peen, Duizendblad, Goudsbloem, Korenbloem, Cichorei, Zonnebloem, Komkommerkruid, Slangenkruid, Phacelia, Gele mosterd, Gewone rolklaver, Luzerne, Witte honingklaver, Esparcette, Rode klaver, Voederwikke, Vlas, Malva, Klaproos, Boekweit, Juffertje in 't groen, Smalle weegbree, Inkarnaatklaver.

Vital earth complex

Samenstelling: Gingellikruid (10%)
Bladraap (1%), Facelia (5%), Zomerwikke (25%),
Boekweit (5%), Alexandrijnse Klaver (20%),
Lupine 16%, Japanse Haver (15%),
Gele Mosterd (3%)
Zaaitijdstip: Mei - Augustus
Zaaihoeveelheid: 40 kg/ha

Vital earth biodiversiteit

Samenstelling: Bladrammens (20%),
Gele Mosterd (20%), Facelia (15%),
Inkarnaatklaver (15%), Esparcette (30%)
Zaaitijdstip: Mei - Augustus
Zaaihoeveelheid: 30 kg/ha



Kennispartners



Informeer bij uw regiovoorlichter naar o.a. het actuele aanbod van bufferstrookmengsels en groene braak.

Bezoek cropsolutions.eu voor meer informatie.



AgruniekRijnvallei

T 0418 65 59 44
www.argroep.nl



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu



groeï door kennis

www.cropsolutions.eu