

Rassenadvies Groenbemesters 2024



agriant
sterk in landbouw

groei door kennis

Advies assortiment groenbemesters

Hieronder zijn verschillende groenbemesters overzichtelijk weergegeven met de belangrijkste gegevens. Hier staan alleen enkelvoudige groenbemesters, echter is van ieder soort groenbemester ook een variant die voldoet aan de eisen voor GLB.

Bladrammenas

- Cordoba, BCA 1 tevens resistent tegen *M. chitwoodi* en *M. fallax*.
 - Valencia, BCA 2 tevens resistent tegen *M. chitwoodi*, *M. fallax* en *M. incognita*
- 25 kg/ha | half juni - begin sept.



Gele mosterd

- Cezanne/Venice, BCA 2
- 20 kg/ha | half aug. - eind sept.



Japanse haver

- Exito mix Agriant, Geen waard plant *Pratylenchus penetrans*, snelle beginontwikkeling en veel organische stof
- 70 kg/ha | half aug. - eind sept.



Italiaans raai gras

- Diverse rassen (late zaai, wintervast)
- 25 kg/ha | eind aug. - okt.



Engels raai gras

- Diverse rassen (vroeg zaai, voederwinning, wortelonkruiden aanpakken, wintervast)
- 25 kg/ha | juni - begin sept.



Facelia

- (bijenbrood, aantrekkelijk voor diverse insecten)
- 10 kg/ha | juni - begin sept.



Vlinderbloemigen

- Witte klaver (geschikt voor inzaai onder dekvruucht, oppervlakkige beworteling, minder geschikt voor NKG)
 - Rode klaver (geschikt voor inzaai onder dekvruucht, grove penwortel, minder geschikt voor NKG)
 - Inkarnaatklaver (eenjarig, hoge org. stof productie, groeit goed onder oude en natte omstandigheden)
 - Alexandrijnse klaver (eenjarig, geschikt voor inzaai onder dekvruucht, slaat makkelijk aan)
 - Perzische klaver (eenjarig, kan later in het jaar gezaaid worden)
- 7 kg/ha | juni - juli
- 14 kg/ha | juni - juli
- 20 kg/ha | juni - eind sept.
- 25 kg/ha | juni - half aug.
- 25 kg/ha | juni - half aug.



Wikken

- (stikstofbinding)
- 10 kg/ha | juni - juli



Tagetes Patula

- Proud Mary, Active bestrijding *Pratylenchus penetrans* (wortelziekteaaltje)
- 20 kg/ha | juni - eind aug.



Zonnebloemen

- (aantrekkelijk gewas, steunt groei van andere componenten in mengsel)



Doelen groenbemester:

Voor de juiste keuze van een groenbemester is het belangrijk om het doel van een groenbemester duidelijk te hebben. Doelen waar je aan kunt denken zijn:

- Organische stof
- Structuur
- Aaltjesbestrijding
- Stikstofbinding
- Biodiversiteit
- NKG
- Voederwinning

| Stengelaaltjes | | | | Vrijlevende wortelaaltjes | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----|--|---------|
| Ditylenchus destructor Destructoraaltje | | Ditylenchus dipsaci Stengelaaltje | | Trichodorus primitivus Trichodorus primitivus | | Trichodorus similis Trichodorus similis | |
| Z | D | ZV | K | Z | D | ZV | K |
| - | - | - | - | ? | ? | ●● | - |
| - | - | - | - | ? | ? | ●●● | ●●● |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? i |
| - | - | - | - | ● | ● | ●●● | ●● |
| - | - | - | - | ● | ● | ●●● | ●●● S |
| - | - | - | - | ●● | ●● | ●●● | ●● |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ●●● S i |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ●●● |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? i | ●●● S |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ●●● |

| Legenda Vermeerdering | |
|-----------------------|---------------------|
| ? | Onbekend |
| -- | Actieve afname |
| - | Natuurlijke afname |
| ● | Weinig |
| ●● | Matig |
| ●●● | Sterk |
| R | Rasafhankelijk |
| S | Serotypeafhankelijk |
| i | Enige informatie |

| Legenda Schade | |
|----------------|---------------|
| | Onbekend |
| | Geen |
| | Weinig 0-15% |
| | Matig 16-35% |
| | Zwaar 36-100% |

| Legenda Grondsoort | |
|--------------------|----------|
| Z | Zand |
| D | Dalgrond |
| ZV | Zavel |
| K | Klei |
| L | Löss |

Tagetes als aaltjesbestrijder

Mochten er op uw percelen problemen voordoen met *Pratylenchus penetrans* (vrijlevend wortellesieaaltje) dan is in zulke gevallen *Tagetes Patula* een geschikte keuze. Zeker nu de nematicide Vydate niet meer toegelaten is in de uienteelt is *Tagetes* een zeer goede oplossing. *Tagetes* heeft een actieve doding op *Pratylenchus penetrans*. Wanneer deze vroeg gezaaid wordt na de wintergerst of tarwe is een doding mogelijk van 95-98% afhankelijk van de weersomstandigheden. Neem voor vragen contact op met uw adviseur.



Best4Soil

Wilt u meer informatie over ziekten, plagen en aaltjes toegepast op uw bouwplan en grondsoort, kijk dan eens op de website van Best4Soil. Hier kunt u een zeer uitgebreid aaltjes- en schimmelschema maken aangepast op uw perceel. Ga naar best4soil.eu of scan de QR-code hiernaast.



Organische stof en inzaaimoment

Is organische stof opbouwen een belangrijk doel van uw groenbemester, houd er dan rekening mee dat er veel verschil zit tussen de groenbemesters en het zaaitijdstip. Bekijk per zaaitijdstip waar u de hoogste organische stof mee kunt behalen.

| Groenbemester | Zaaitijdstip | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| | 15 juli | 1 aug. | 15 aug. | 1 sept. | 15 sept. | 1 okt. | 15 okt. |
| Winterrogge | | | 800 | | | 650 | 400 |
| Japanse haver | - | 1650 | 1000 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| Wikke | 800 | 700 | 500 | 350 | 250 | - | - |
| Bladrammanas | 2050 | 1600 | 950 | 650 | 350 | 150 | - |
| Italiaans raaigras | 1850 | 1600 | 1250 | 1000 | 750 | 450 | 200 |
| Facelia | - | 1100 | 600 | 350 | 150 | 50 | - |
| Rietzwenkgras | - | - | - | - | 1050 | - | - |
| Gele mosterd | 1800 | 1250 | 750 | 500 | 350 | 250 | - |
| Tagetes | 2500 | 1350 | 1200 | - | - | - | - |

Aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in kg per ha van een aantal groenbemesters afhankelijk van het zaaitijdstip dan wel oogstmoment van het hoofdgewas in geval van onderteelt.



Advies assortiment meervoudige mengsels

Viterrra Raps



Samenstelling: Alexandrijnse klaver (8%), Olievlas (23%), Perzische klaver (16%) en Facelia (53%)

Zaaitijdstip: Begin juli - eind augustus

Zaaihoeveelheid: 15 kg/ha

Voordelen: Biodiversiteit, niet overwinterend en NKG

Terralife N-Fixx 50

Samenstelling: Alexandrijnse klaver (3%), Erwten (31%), Vlas (10,5%), Facelia (4%), Niger (4%), Zonnebloem (12%), Sorghum (7,5%), Zomerwikken (26%), Perzische klaver (2%)

Zaaitijdstip: Begin juli - eind augustus

Zaaihoeveelheid: 40-45 kg/ha

Voordelen: Bindt stikstof

Vital Earth - NKG Zomer

Samenstelling: Zomerwikke (45%), Facelia (15%), Zwaardherik (20%), Esparcette (20%)


Zaaitijdstip: Juni - augustus

Zaaihoeveelheid: 30 kg/ha

Voordelen: Geschikt voor NKG, weinig waardplanten voor aaltjes, stikstofbinding

Volggewas: Aardappels en uien

Viterrra Universal



Samenstelling: Facelia (49%), Japanse Haver (27%), Witte klaver (14%), Alexandrijnse klaver (5%), Perzische klaver (5%)


Zaaitijdstip: Begin juli - begin september

Zaaihoeveelheid: 25 kg/ha

Voordelen: Cruciferenvrij

Volggewas: Aardappelen, granen, koolzaad en suikerbieten

Terralife Solarigol



Samenstelling: Japanse haver (9%), Vlas (9%), Alexandrijnse klaver (24%), Zomerwikken (5%), Tillage rammenas (10%), Deder (7%), Niger (36%)

Zaaitijdstip: Half juli - half augustus

Zaaihoeveelheid: 35 kg/ha

Voordelen: Snelle bedekking en intensieve beworteling

Greencover NKG

Samenstelling: Zonnebloem (50%), Phacelia (20%), Gele mosterd (20%) Vlas (10%)

Zaaitijdstip: Juli - begin september

Zaaihoeveelheid: 20 kg/ha

Voordelen: Geschikt voor NKG

Volggewas: Aardappels en uien

Samenstellingen kunnen afwijken als gevolg van duizendzadengewicht en beschikbaarheden van de afzonderlijke componenten. Samenstellingen zijn weergegeven op basis van zaadaantal.



Overwinteren en grondbewerking

Er is steeds meer aandacht voor groenbemesters in combinatie met niet-kerende grondbewerking (NKG) en bedekking van de bodem in de winter. De bodembedekking (groen houden) is bij NKG veel belangrijker dan een massaal bovengronds gewas.

Er zijn ook punten te verdienen met het nieuwe GLB wanneer de groenbemester groen de winter over gaat. U kunt dit bereiken door aan uw groenbemesters het mengsel "Soilprotect" toe te voegen.

Terralife Soilprotect

Samenstelling: Engels raai gras (26%), Smalle weegbree (1,5%), Vlas (24%), Inkarnaatklaver (11,5%), Winterwikken (35%), Hybride klaver (2%)

Zaaitijdstip: Eind augustus - midden september

Zaaihoeveelheid: 15 kg/ha

Nawerking gewasbeschermingsmiddelen

Houd rekening met de incidentele nawerking van gewasbeschermingsmiddelen, die in de teelt voor de te zaaien groenbemester zijn ingezet. Droogte en aanwendingstijdstip kunnen afbraak van meer persistente middelen vertragen. Dit kan een negatief effect hebben op de groei van sommige groenbemestersoorten. Advies: verwacht u nawerking van herbiciden en wilt u geen risico's nemen? Zaai dan een gras(mengsel), maar zeker geen cruciferen (zoals mosterd of bladrammenas).

Zelf mengen en losse componenten

Wanneer u geen gebruik wilt maken van standaard mengsels, heeft u ook nog de mogelijkheid om zelf te mengen. Losse componenten als bladrammenas en gele mosterd, Japanse haver, zonnebloemen, facelia en grassen zijn verkrijgbaar. Zowel bij het gebruik van mengsels als bij losse componenten dient u de aankoopbewijzen en etiketten van de gebruikte producten vijf jaar in uw administratie te bewaren.

Bestellen

Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze. U kunt uw groenbemester bestellen via **0591 64 22 22** of een E-mail naar **bestellingen@agriant.nl** of rechtstreeks bij uw buitendienstmedewerker.



groei door kennis

agriant
sterk in landbouw

T 0591 64 22 22  www.agriant.nl

www.cropsolutions.eu