

Rassenadvies gele en rode zaaiuien

Een gepast ras kiezen is perceel afhankelijk en dus maatwerk. Bespreek daarom met uw CZAV adviseur wat de beste strategie kan zijn. In onderstaande tabel zijn de rassen opgenomen die CZAV adviseert.

| | | Bewaarperiode | | |
|----------------|--------|---------------|--|--------------------------------------|
| | | Afland/Kort | Midden | Lang |
| Oogst-tijdstip | Vroeg | Hybing | Hypark | Centro |
| | Midden | | Hytech - Hyway - Hybelle - Allurion | Rockito |
| | Laat | | Donna - Red Baron | Dormo - Viggo - Hyfive - Romy |

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,6 en 4,0 eenheden te zaaien en bij rode tussen de 3,1 en 3,4 eenheden. Bij Priming \pm 10% minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quikstart** en **geprimed** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versnelt/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting van bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusarium aantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Valse meeldauw is met het huidige middelenpakket steeds lastiger te beheersen. Prospero is een gele ui met een resistentie tegen valse meeldauw.
- Nu de **Vydate** weggevallen is onderzoeken we al enkele jaren alternatieven als Nemguard en Nemater. Verwacht je een probleem met aaltjes of andere bodeminsecten bespreek de mogelijkheden op voorhand met uw CZAV adviseur.
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed/vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Hierdoor verlaagt de kans op aantasting van **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Teelt u regelmatig granen en/of graszaad dan is er hogere kans op **ritnaaldenschade** o.a. in uien. Via de module 'Mijn kniptor monitor' op 'Mijn CZAV' krijgt u advies over het optimale tijdstip om de kniptor te bestrijden.
- Door inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.



T 0113 62 90 00
www.czav.nl

© CS - 10/24

Rassenadvies Zaaiuien Kleigrond 2025



“Mijn overzicht van alle uienrassen, met tips en teeltadvies.”

Teler Anne



groei door kennis



Raseigenschappen en -opbrengsten op kleigrond

| Ras | Zaadhuus | Vroegheid ¹ | Vorm ² | Uniformiteit ³ | Huidvastheidsindex ⁴ | Hardheidsindex ⁵ | Droegstofgehalte ⁶ (relatief) | Eénkernheidsindex ⁷ | Spruitrust ⁸ | Netto-opbrengst 2018-2023 ⁹ | |
|----------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | | ZW NL | Midden NL |
| Nation | SYN | 7,6 | 1,8 | 2,5 | 99 | 95 | 96 | 66 | 5,6 | 96 | 99 |
| Novista | TAK | 7,4 | 1,9 | 2,5 | 98 | 89 | 97 | 47 | 5,5 | 91 | 91 |
| SV 3557 ND | SEM | 7,4 | 1,8 | 2,4 | 99 | 97 | 99 | 83 | 5,6 | 101 | 92 |
| Hypark | DGS | 7,3 | 2,0 | 2,7 | 99 | 94 | 98 | 81 | 5,3 | 98 | 99 |
| Paradiso | HAZ | 7,1 | 1,8 | 2,6 | 101 | 112 | 98 | 68 | 5,6 | 96 | 90 |
| Centro | HAZ | 7,0 | 1,9 | 2,5 | 99 | 97 | 100 | 76 | 5,4 | 100 | 96 |
| Viggo | HAZ | 6,9 | 1,8 | 2,4 | 99 | 98 | 97 | 72 | 5,0 | 102 | 96 |
| Hybound | DGS | 6,9 | 1,8 | 2,6 | 100 | 96 | 99 | 80 | 5,5 | 101 | 105 |
| Bruce | TAK | 6,8 | 2,0 | 2,6 | 99 | 94 | 104 | 48 | 5,7 | 97 | 91 |
| Rockito | SEM | 6,6 | 1,8 | 2,6 | 102 | 107 | 98 | 82 | 5,6 | 96 | 92 |
| Firmo | HAZ | 6,6 | 1,9 | 2,5 | 100 | 108 | 103 | 60 | 5,5 | 92 | 91 |
| Klondike 4400 | KBZ | 6,6 | 1,9 | 2,4 | 99 | 98 | 101 | 56 | 5,2 | 97 | 97 |
| Hyroad | DGS | 6,5 | 1,9 | 2,8 | 101 | 102 | 104 | 84 | 5,6 | 100 | 101 |
| Bingo | KBZ | 6,5 | 1,9 | 2,4 | 100 | 93 | 102 | 57 | 5,2 | 98 | 100 |
| Hybelle | DGS | 6,4 | 1,9 | 2,6 | 100 | 98 | 99 | 81 | 5,3 | 104 | 109 |
| Dormo | HAZ | 6,4 | 1,9 | 2,6 | 101 | 114 | 100 | 72 | 5,5 | 99 | 99 |
| Hyway | DGS | 6,3 | 1,9 | 2,6 | 99 | 95 | 101 | 82 | 5,5 | 101 | 106 |
| Promotion | SYN | 6,3 | 1,9 | 2,6 | 100 | 98 | 97 | 69 | 5,4 | 99 | 106 |
| Motion | SYN | 6,2 | 1,9 | 2,6 | 101 | 97 | 97 | 72 | 5,3 | 101 | 104 |
| Donna | HOZ | 6,1 | 1,9 | 2,3 | 100 | 94 | 100 | 82 | 5,3 | 107 | 109 |
| Hyfive | DGS | 5,7 | 1,8 | 2,6 | 101 | 102 | 101 | 83 | 5,3 | 103 | 102 |
| Hystore | DGS | 5,4 | 1,9 | 2,3 | 100 | 99 | 102 | 74 | 5,4 | 103 | 102 |
| Delta Gigant ¹⁰ | DSH | 5,4 | 1,8 | 2,4 | 101 | 110 | 96 | 80 | 5,9 | 111 | 111 |
| Hoza ¹⁰ | HOZ | 5,2 | 1,9 | 2,3 | 101 | 105 | 104 | 83 | 5,3 | 101 | 102 |
| 100 = ... ton/ha | | | | | 5,8 | 59,7 | 11,3 | | | 61,8 | 59,0 |

¹ gebaseerd op vroegheid strijken; hoger cijfer = vroeger. ² 1-1,3 = hooggrond; 1,4-1,6 = hooggrond-rond; 1,7-2,0 = rond; 2,1 en hoger = rond-platgrond.
³ 1 = minder dan 10% afwijkende vorm; 3 = meer dan 25% afwijkende vorm. ⁴ hoger getal = betere huidvastheid; 100 = gemiddelde van alle rassen; dit is geen maat voor het percentage kale uien. ⁵ hoger getal = harder; 100 = gemiddelde van alle rassen. ⁶ 100 = gemiddelde van alle rassen.
⁷ percentage uien met 1 hart of 2 harten op korte afstand van elkaar. ⁸ hoger cijfer = langere spruitrust. ⁹ opbrengst na korte bewaring (eind januari; Zand) c.q. lange bewaring (mei; Klei) > 35 mm, exclusief rotte of kale uien en schillen; 100 = gemiddelde van alle rassen. ¹⁰ bij Hoza en Delta Gigant is 10% meer zaad gebruikt dan bij de andere rassen, overeenkomstig het praktijkadvies voor deze rassen

Kwaliteits- en opbrengstindex

In onderstaande grafiek zijn de rassen afkomstig van Uireka rassenlijst ingedeeld op basis van opbrengst en kwaliteitseigenschappen (gemiddelde huidvastheidsindex en hardheidsindex).



groei door kennis

www.cropsolutions.eu