

Rassenkeuze zaaiuien

Het is van belang om bij de rassenkeuze rekening te houden met de vroegheid, kwaliteit, opbrengst en duur van de bewaarperiode. Bij het selecteren van de beste rassen wordt gekeken naar verschillende rassenmerken:

- Opbrengst
- Hardheid
- Natuurlijke spruitrust
- Bewaarbaarheid
- Huidvastheid
- Grondsoort

Zaaien

Bij het zaaien kun je het best rekening houden met een veldopkomst van 90% en een kiemkracht van 95%. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de hoeveelheid zaaizaad eenheden. Bij zaadvaste en late rassen kun je beter dikker zaaien, zodat het gewas sneller afrijpt. Een goede richtlijn is: elke 5 planten meer zaaien per m² (0,2 eenheid per ha), is één dag vroeger oogsten.

Priming

Geprimed uienzaad is voorgekiemd. Het zaad is op gang gebracht en op precies het juiste moment is het ontkiemingsproces stopgezet. Zodra het zaadje in vochtige grond wordt gezaaid, zal het kiemproces direct hervatten. De belangrijkste voordelen van geprimed zaaizaad zijn:

- Bij vroeg zaaien is er een eerdere veldopkomst, zeker bij een lagere bodemtemperatuur.
- Gelijkmatische opkomst en afrijping, hierdoor is de onkruidbeheersing eenvoudiger uit te voeren en is de geoogste partij uien egalier.
- Door ongeremde beginontwikkeling is er minder risico op ziekten en plagen met name bij opkomst.

	Gele uien	Rode uien
Optimale zaaidichtheid	80 planten/m ²	70 planten/m ²
Standaard zaaiadvies	3,8 eenheden	3,3 eenheden
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai	3,6 eenheden	3,2 eenheden
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai	4,0 eenheden	3,4 eenheden
Priming onder standaard omstandigheden	3,5 eenheden	3,0 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaai-bed en weersomstandigheden)	1,5 – 3,0 cm	

Bestellen

Afhankelijk van uw situatie en grondsoort kan er een juiste rassenkeuze gemaakt worden. Uw adviseur kan u hierbij helpen. Bestel uw geprimed uienzaad uiterlijk voor 1 december, zo voorkomt u teleurstellingen. **Besteld uienzaad kan niet retour.** Bestellen kan via uw buitendienstman of stuur een mail naar Bestellen@czav.nl.



groei door kennis



T 0113 62 90 00
www.czav.nl

www.cropsolutions.eu

© CS - 10.24

Rassenadvies Zaaiuien Zandgrond 2025



“Mijn overzicht van alle uienrassen, met tips en teeltadvies.”

Teler Anne



groei door kennis

Raseigenschappen en -opbrengsten op zandgrond

Ras	Zaadhuis	Vroegheid ¹	Huidvastheid	Spruitrust	Hardheid	Bewaarbaarheid	Opbrengst
Lovito	SEM	8,5	6,0	6,0	7,0	+	+++
Heybound	DGS	8,2	8,0	9,0	8,0	+	+++
Vento	HAZ	8,2	8,0	7,3	9,0	+++	++++
Summit	DGS	8,1	7,0	8,0	8,0	++++	++++
SV3557ND	SEM	8,1	8,0	9,0	8,0	+++	++++
Centro	HAZ	8	7,5	7,5	7,5	++++	
Paradiso	HAZ	7,6	7,5	7,5	9,5	+++	++++
Red Tide	DGS	7,5	8,0	7,0	8,0	++++	
Viggo	HAZ	7,5	7,5	7,8	9,0	++++	++++
Hypark	DGS	7,3	8,0	7,0	8,0	++++	++++
Hyroad	DGS	7,2	9,0	8,0	9,0	++++	++++
Hyway	DGS	6,8	8,0	8,0	8,0	++++	++++
Dormo	HAZ	6,7	8,0	7,9	9,5	++++	++++
Hybelle	DGS	6,5	7,0	7,0	8,0	+++	+++
Hyfive	DGS	6,3	9,0	9,0	9,0	++++	++++

Zaadhuizen: DGS (De Groot & Slot), HAZ (Hazera), SEM (Seminis)

Rassenadvies gele en rode zaaiuien

Met jarenlange ervaring in de teelt van zowel plant- als zaaiuien positioneert CZAV zich als betrouwbare partner in de uienketen. Het aanbod zaaigoed van de zaadhuisen is groot. Rassen in diverse interesses zijn daarmee beschikbaar zoals tolerante, lang bewaarbare, afland, vroege, late of rode rassen. Naast kwaliteits-uitgangsmateriaal staat CZAV garant voor professionele teeltbegeleiding in onder meer de uiensector. Onze buitendienstmedewerkers verlenen uiterste inspanning om de uienteelt samen tot een goed en gezond einde brengen!

Oogsttijdstip	Bewaarperiode		
	Afland/Kort	Midden	Lang
Vroeg	SV3557ND - Hybing	Hypark - Vento - Nico	Centro
Midden	Summit	Hyway - Hybelle - Hyroad - Paradiso - Allurion	Rockito
Laat		Dormo - Viggo	Donna - Hyfive

De rassen in **rode letters** zijn rode zaaiuien

Aandachtspunten en tips

- Voor een uiteindelijk goed plantaantal adviseren we afhankelijk van grondsoort, zaaimoment en zaaiomstandigheden bij gele uien tussen de 3,8 en 4,2 eenheden te zaaien en bij rode uien tussen de 3,5 en 3,8 eenheden. Bij Priming kunt u \pm 10% minder zaaien.
- Door het gebruik van de startmeststof **Quickstart** en **geprimed** zaaizaad wordt de opkomst van het gewas versneld/verbeterd. Hierdoor wordt ook de kans op aantasting door bodeminsecten (o.a. bonen- en uienvlieg) kleiner.
- Indien er kans is op een lichte besmetting met **Fusarium**, kies dan voor het tolerante (niet resistent!) ras Hysky/Hygate. Is er in het verleden al eens een Fusariumaantasting geweest, overweeg dan een ander perceel te kiezen.
- Valse meeldauw is met het huidige middelenpakket steeds lastiger te beheersen. Prospero is een geel uienras met een resistentie tegen valse meeldauw.
- We onderzoeken al enkele jaren diverse middelen ter ondersteuning op de beheersing van aaltjesschade. Verwacht u een probleem met **aaltjes** of andere bodeminsecten bespreek de moge- lijkheden op voorhand met uw CZAV-adviseur
- Zorg dat gewasresten van de voorvrucht en vaste mest goed/vroeg ingewerkt zijn en niet aan de oppervlakte liggen. Dit verlaagt de kans op aantasting door de **bonenvlieg** voor/tijdens opkomst.
- Teelt u regelmatig granen en/of graszaad dan is er hogere kans op **ritnaaldenschade** o.a. in uien. Via de module 'Mijn kniptor monitor' op 'Mijn CZAV' krijgt u advies over het optimale tijdstip om de kniptor te bestrijden.
- Door de inzet van steriele insectentechniek (SIT) wordt de schade van de **uienvlieg** onder controle gehouden.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu