



GOED
SCHUDDEN
VOOR
GEBRUIK

BIEN
AGITER
AVANT
L'EMPLOI



GROEIVERBETERAAR
STIMULATEUR
DE CROISSANCE

aminoboost



PFC 1 (A)(II): Vloeibare organische meststof

Omschrijving meststof:
Aminozuuroplossing

Samenstelling

- 3,7% Totaal Stikstof (N)
- 3,7% Organische Stikstof van dierlijke oorsprong, vv
- 0,0% Uit mest
- 14,0% Organische koolstof
- 35,0% Droge stof, $C_{org}/N_{tot} = 3,78$
- 22,0% Aminozuren, vv
- 68,0% Vrije L-alfa aminozuren
- 3,0% Fulvinezuur

Toegelaten
voor gebruik
in de biologische
landbouw volgens
EU 2021/1165



PFC 1 (A)(II): Engrais organique liquide

Description engrais:
Solution d'acides aminés

Composition

- 3,7% Azote total (N)
- 3,7% Azote organique d'origine animale, vv
- 0,0% de fumier
- 14,0% Carbone organique
- 35,0% Matière sèche, $C_{org}/N_{tot} = 3,78$
- 22,0% Acides aminés vv
- 68,0% Acides aminés libres L-alfa
- 3,0% Acides fulviques

Autorisé pour une
utilisation dans
l'agriculture
biologique selon
l'UE 2021/1165

Vol. **10L** e (11,5 kg)



aminoboost



Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Algemeen	Gedurende en na stressperiode, interval 10-14 dagen	2-3 liter per ha	Min. 200 liter water per ha
	Toevoeging aan GBM ter verbetering effectiviteit	100-200 ml per 100 liter water	
Kleinfruit, pit- en steenfruit	Voor en na de bloei, verbetering vruchtzetting	2,5-5 liter per ha	Min. 200 liter water per ha
	In combinatie met calcium toepassing	1 liter per ha	Min. 150 liter water per ha, liefst eind van de dag
	Na de oogst. Herhalen 8-14 dagen	1-2 liter per ha	T.b.v. wintervastheid en opslag reservevoedsel
Sierplanten en boomkwekerij	Interval 10-14 dagen	1-2 liter per ha	Min. 200 liter water per ha
Fertigatie	Interval 7-10 dagen	5-10 liter per ha	



Bestanddelen:

Eiwithydrolysaten* (CAS: 9015-54-7)
Fulvineuren* (CAS: 479-66-3)
Thijmextract* (CAS: 8007-46-3)

*CMCI: Stoffen en mengsels als primair materiaal.

Mengbaarheid en toepassing:

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij tijdig eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden:

- CropActiv biostimulantien vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, droge, droge plaats.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 2 jaar na productiedatum

Producent / Producteur: AminoCore, Sandhook 42, 45831 Nordhorn Germany



Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Généralités	Pendant et après la période de stress, à 10-14 jours d'intervalle	2-3 litres par ha	Min. 200 litres d'eau par ha
	Ajout à la protection phytosanitaire pour améliorer l'efficacité	100-200 ml par 100 litres d'eau	
Petits fruits, fruits avec pépins et noyaux	Avant et après la floraison, amélioration de la fructification	2,5-5 litres par ha	Min. 200 litres d'eau par ha
	En combinaison avec application de calcium	1 litre par ha	Min. 150 litre d'eau par ha, de préférence à la fin de la journée
	Après la récolte. Répéter 8-14 jours	1-2 litre par ha	Concernant la résistance à l'hiver et le stockage des aliments de réserve
Plantes ornementales et pépinières	À 10-14 jours d'intervalle	1-2 litre par ha	Min. 200 litres d'eau par ha
Fertigation	À 7-10 jours d'intervalle	5-10 liter per ha	



Composants:

hydrolysats de protéines* (CAS : 9015-54-7)
Acides fulviques* (CAS : 479-66-3)
Extrait de thym* (CAS : 8007-46-3)

*CMCI: Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangeabilité et application:

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25°C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage:

- Conserver les biostimulants CropActiv à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.
- Tenir hors de portée des enfants

Action:

CropActiv AminoBoost est un biostimulant liquide et contient 15% d'acides aminés libres. Par une dégradation enzymatique des protéines, les acides aminés dans CropActiv AminoBoost sont de très haute qualité. La dégradation par les enzymes au lieu de produits chimiques assure également la présence d'acides aminés fragiles tels que le tryptophane. De plus, l'absorption par la feuille est meilleure grâce à la forme aminée L-α. CropActiv AminoBoost se caractérise par une forte concentration d'acides aminés.

CropActiv AminoBoost est conseillé pendant une période de stress pour aider la plante à traverser une période difficile avec de l'énergie supplémentaire. La récupération après une période de stress est également obtenue avec une pulvérisation CropActiv AminoBoost.

Application:

Pulvériser: CropActiv AminoBoost sur les feuilles sèches pendant et après une période de stress ou en automne sur les cultures pérennes. Résistant à la pluie après 2 heures. CropActiv AminoBoost peut améliorer l'absorption d'autres ressources dans le mélange en cuve. Ajoutez CropActiv AminoBoost en dernier pour le mélange en cuve. En cas de doute, consultez votre conseiller.



groeï door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge.
Tél. : +31 (0)113 629 000

www.cropsolutions.eu



www.agrirecover.eu