

Slakkenbeheersing

We zien ondanks de droogte, de afgelopen jaren een toename van het slakkenprobleem. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaai-bed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De slakkenkorrels zijn op basis van de werkbare stof ijzer(III)fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk.

Zaaihoeveelheid

FarmPlus Noordwest onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zwaarte van de grond
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%

Bestellen

U kunt uw zaai granen eenvoudig bestellen in de Bestelapp, op de website in **Mijn Agrotheek**, via info@agrotheek.nl, telefonisch of bij uw teeltspecialist.



groei door kennis



T 088 9900 713 – www.farmplus.nl

www.cropsolutions.eu

© CS - 0625

CropSeeds Wintertarwe Noordwest-Nederland

OOGST
2025



*“Altijd het juiste
tarweras voor
mijn bedrijf.”*

Teler Anne



groei door kennis

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld uw grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormt een belangrijk criterium. FarmPlus adviseert rassen in te zetten met een fusariumresistentie hoger dan 6,5.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor gele roest resistentie.
- Een spreiding in vroegheid van rassen binnen uw bouwplan leidt tot minder oogst-risico en een goede arbeidsverdeling.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Wintertarweadvies oogst 2025



	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 		Calgary Gambit Extase	
Maaltarwe 	Chevignon	Sabrum Erruptium	
Voertarwe 	Porthus	Keitum Spearhead	Champion

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Adviseur Wouter

Korrelopbrengsten

Overzicht van gemiddelde resultaten 2019 t/m 2024

Rasnaam	Segment	Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Informer		91	95	92	94	97	96
Extase		98	98	98	100	98	99
Calgary		94	94	96	96	95	96
Garfield		100	98	97	100	96	98
Stanwix		98	102	96	95	99	98
Revolution		106	102	99	105	101	100
Gambit		97	93	92	95	99	96
Olaf		111	109	108	105	105	103
Marlin		96	99	98	102	105	101
Sabrum		98	96	98	98	99	99
Cambria		96	99	99	97	99	99
Erruptium		104	108	105	104	103	100
Artman		100	97	98	100	99	97
Kreuzer		98	99	101	102	102	102
Shamal		102	106	107	101	103	107
Shrek		106	111	106	105	103	101
Lamant		114	116	112	108	109	110
Positiv		101	97	101	103	102	99
Bairstow		93	93	95	93	98	98
Spearhead		97	99	100	97	100	103
Champion		95	95	95	104	106	104
Gleam		93	91	93	93	94	98
100 = ... Ton/ha		10,9	10,8	9,8	12,0	12,0	10,9

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2025

Raseigenschappen

gemiddelde resultaten over de jaren 2021 t/m 2024

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoliter gewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekken-ziekte	Fusarium in de aar	
Extase		99	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	6,5	100
Calgary		102	7,5	7,5	7,0	6,0	9,0	6,5	8,0	7,0	6,5	99
Gambit		102	7,5	7,0	6,5	6,0	9,0	6,0	8,5	7,0	7,0	99
Chevignon*		98	7,5	8,0	7,5	6,5	8,0	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Sabrum		93	8,5	7,0	6,5	5,5	9,0	6,0	8,5	6,0	6,5	98
Erruptium		101	7,0	7,5	7,0	5,5	9,0	8,0	8,0	8,0	7,0	102
Porthus*		105	6,5	7,5	8,0	6,5	7,5	6,0	5,5	7,5	7,5	101
Keitum**		100	8,0	7,0	6,0	6,5	7,5	7,0	9,0	7,0	7,0	100
Spearhead		98	8,0	6,5	6,5	5,5	8,5	6,5	8,0	7,0	6,5	96
Champion		96	8,0	6,0	6,0	6,0	9,0	5,0	8,0	8,0	6,5	95

100 = 86 cm

* Staan niet op de rassenlijst: raseigenschappen en resistentie op basis van informatie kwekers en praktijk

** Resistent tegen oranje tarwegalmug

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2025



groei door kennis



www.cropsolutions.eu

Aanbevolen rassen (2021-2024)

Extase

- Baktarwe
- Zeer hoge opbrengst
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig

Calgary

- Maaltarwe
- Zeer hoge opbrengst
- Middenvroeg ras
- Zeer gezond
- Ook geschikt voor lichtere gronden

Erruptium Nieuw

- Maaltarwe
- Zeer gezond
- Hoge tot zeer hoge opbrengst
- Stevig middenlang stro
- Midden vroeg afrijping

Gambit

- Baktarwe
- Middenvroeg ras
- Zeer hoge opbrengst
- Excellente gele roest resistentie
- Geschikt voor zandgrond

Sabrum

- Maaltarwe
- Vroeg ras
- Kort en zeer stevig
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe
- Zeer hoge gele roestresistentie

Keitum

- Voertarwe
- Middenvroeg ras
- Zeer hoge opbrengst
- Geschikt voor tarwe-op-tarwe
- Lang en stro-rijk

Champion

- Voertarwe
- Middenvroeg ras
- Zeer hoge opbrengst
- Zeer hoge resistentie tegen roest en bladvlekkenziekte
- Kort en zeer stevig

Tarwe-op-tarwe

Wanneer u tarwe-op-tarwe teelt, kiest u dan voor Sabrum of Keitum. Overlegt u voor een passend advies met uw teeltspecialist voor het maken van de beste keuze.

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.