

Slakkenbeheersing

Afgelopen jaar hebben we door de natte omstandigheden een enorme toename van het slakkenprobleem ervaren. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De korrels zijn op basis van de werkbare stof ijzer(III)fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakken korrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk. Bijmenging in de zaaibak is ook goed mogelijk, bestel tijdig voldoende slakkenkorrels.

Zaaihoeveelheid

FarmPlus onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zwaarte van de grond
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%



groei door kennis




T 088 9900 713 – www.farmplus.nl

www.cropsolutions.eu

© CS - 0625

CropSeeds Wintertarwe Zuid-Nederland

OOGST
2025



*“Altijd het juiste
tarweras voor
mijn bedrijf.”*

Teler Anne



groei door kennis

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld je grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormen een belangrijk criterium, houdt hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roest resistenties.
- De markt vraagt steeds meer om kwalitatief goede Nederlandse tarwe. We weten dat het ras en een goed eiwitgehalte van groot belang is. FarmPlus betaald op baktarwe met een eiwit percentage boven de 11% een oplopende premie.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- Maal- en baktarwerassen zijn stabiel in opbrengst over de jaren heen en houden het teeltrendement hoog. Deze hebben ook afgelopen jaar de hoogste hectolitergewichten laten zien.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Wintertarweadvies FarmPlus oogst 2025



	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 	Addiction	Reform Extase	Stanwix
Maaltarwe 	Cubitus Chevignon	Calgary	
Voertarwe 	Shamal	Skyscraper	Champion

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Adviseur Wouter

Resultaten proefvelden 2024

FarmPlus heeft op twee locaties binnen haar werkgebied proefvelden met wintertarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn een belangrijke pijlers in de selectie van rassen. Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proefvelden van oogst 2024. In de laatste kolom is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Zuidwest-Nederland van het jaar 2024 opgenomen.

Rasnaam	Segment	Westmaas	Rusthoeve	HL (2024)	Gewogen gemiddelde 2024	Gemiddelde over jaren	Jaren onderzoek	CSAR 2025 ZW
Reform		97	97	76,8	97	96	5	–
Extase		103	107	74,5	105	102	5	99
Addiction		101	109	74,2	105	104	3	–
Stanwix		101	95	73,7	98	98	1	98
Chevignon		97	97	75,6	97	100	5	–
Calgary		99	94	73,2	96	99	5	99
Cubitus		98	107	74,4	102	99	4	–
Champion		105	106	69,0	105	105	2	104
Shamal		109	106	75,0	107	106	4	107

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2025

Raseigenschappen (2021-2024)

In onderstaande tabel een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per winterarwasras.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoliter gewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekken-ziekte	Fusarium in de aar	
Addiction ^{*/**}		97	7,5	8	8	7	7,5	6	8	7	6	104
Reform [*]		99	8	6	7	7	6,5	7,5	8	7	7	105
Extase		99	8	8	7	7	8	7	8	8	6,5	100
Stanwix		107	8	6,5	6	6,5	9	7,5	8,5	8	7	102
Calgary		102	7,5	7,5	7	6	9	6,5	8	7	6,5	99
Chevignon [*]		98	7,5	8	7,5	6,5	8	6,5	7	7,5	6	102
Cubitus [*]		96	8	8	8	6,5	8,5	7,5	7	8	6,5	103
Residence [*]		102	6	7,5	7,5	5,5	9	7,5	8	6,5	7	101
Skyscraper ^{*/**}		93	8	7	7,5	6,5	7,5	6,5	8	7	6,5	99
Champion		96	8	6	6	6	9	5	8	8	6,5	95
Shamal		104	6	8	7,5	7	7,5	8,5	8,5	7	7	100

100 = 86 cm

* staat niet (meer) op de CSAR-rassenlijst vermelde raseigenschappen op basis van informatie van historie, kwekers en praktijk

** resistent tegen aantasting van oranje tarwegalmug

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2025

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Aanbevolen rassen (2021-2024)

Extase

- Baktarwe
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig

Chevignon

- Maaltarwe
- Vroeg ras
- Weinig ziektegevoelig
- Grootste ras Noordwest-Europa

Addicton

- Baktarwe
- Vroegrijp ras
- Resistentie tegen oranje galmug

Reform

- Baktarwe
- Goed gewaardeerd door verwerkers
- Hoge HL-gewichten
- Middenvroeg ras, kort en stevig
- Geschikt voor latere zaai

Calgary

- Maaltarwe
- Middenvroeg ras
- Zeer gezond
- Ook geschikt voor lichtere gronden

Stanwix

- Goeie baktarwe
- Weinig ziektegevoelig
- Geschikt voor vroege zaai
- Lang en stevig

Tarwehalmmdoder

FarmPlus kan het ras Calgary ontsmet met Latitude leveren voor percelen waarbij tarwehalmmdoder speelt. De toelating van Latitude komt te vervallen, dit is het laatste jaar, en het product is ook niet onbeperkt beschikbaar. Nieuwe chemische oplossingen worden niet verwacht. Wanneer u tarwe op tarwe teelt, kijk dan goed welke rassen hiervoor geschikt zijn, en welke teeltstrategie en maatregelen het beste werken.

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.



groei door kennis

www.cropsolutions.eu