

Folioplus

Calcium + Magnesium



PFC 7: Bemestingsproductenblend

UFI code: X600-S0XR-900Q-0U63

Samenstelling

8,3% totaal Stikstof (N) (121 g/l)

13,1% Calciumoxide (CaO)

oplosbaar in water (192 g/l)

2,5% Magnesiumoxide (MgO)

oplosbaar in water (37 g/l)



PFC 7: Combinaison de fertilisants

Code UFI: X600-S0XR-900Q-0U63

Composition

8,3% Azote total (N) (121 g/l)

13,1% Oxyde de calcium (CaO)

soluble dans l'eau (192 g/l)

2,5% Oxyde de magnésium (MgO)

soluble dans l'eau (37 g/l)

Inh. 10L e (14,6 kg)



Foliplus

Calcium + Magnesium



groei door kennis

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Advies

| Gewas | Tijdstip van toediening | Dosering | Opmerkingen | Culture | Moment d'administration | Dosage | Commentaires |
|----------|--|--|---|-------------|---|---|---|
| Algemeen | Bij verwacht gebrek | 3-8 liter/ha | Bij voorkeur toepassen op een droog gewas Niet toepassen tijdens de bloei Boven 20 °C de dosering verlagen naar 5 liter per ha. Boven 25 °C niet toepassen | Généralités | En cas de carence prévue | 3-8 litres/ha | Appliquer de préférence sur une culture sèche Ne pas appliquer pendant la floraison Au-dessus de 20 °C, réduire le dosage à 5 litres par ha. Au-dessus de 25 °C ne pas appliquer |
| Fruit | Normaal starten in juni, bij verwacht gebrek direct starten na de bloei | 5-7 liter/ha in min. 250 liter water/ha | | Fruits | Commencer normalement en juin, en cas de manque prévu, commencer immédiatement après la floraison | 5-7 litre/ha dans min. 250 litres d'eau/ha | |

Bestanddelen

Calciumnitraat I (CAS: 10124-37-5)

Magnesiumnitraat I (CAS: 10377-60-3)

¹ CMC 1: Stoffen in mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Date d'expiration : 3 ans après date de production

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)

Conseil

| Culture | Moment d'administration | Dosage | Commentaires |
|-------------|--------------------------|---------------|---|
| Généralités | En cas de carence prévue | 3-8 litres/ha | Appliquer de préférence sur une culture sèche Ne pas appliquer pendant la floraison Au-dessus de 20 °C, réduire le dosage à 5 litres par ha. Au-dessus de 25 °C ne pas appliquer |

Composants

Nitrate de calcium I (CAS: 10124-37-5)

Nitrate de magnésium I (CAS: 10377-60-3)

¹ CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

Mélangabilité et application

- Mélangable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Ne pas utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5°C en 25°C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrains foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.



www.agrerecover.eu



Danger
Gevaar