



BLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE



# Foliplus Fosfaat



## PFC 1 (C)(I)(b)(ii):

Samengestelde vloeibare anorganische macronutriënten-  
meststof op basis van een oplossing

## Omschrijving meststof:

PK(Mg) meststof met micronutriënten 29,3-5 (+5,1)

## Samenstelling

- 29,3% Totaal Fosforpentoxide ( $P_2O_5$ ) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat (380 g/l)
- 5,0% Kaliumoxide ( $K_2O$ ) oplosbaar in water (65 g/l)
- 5,1% Magnesiumoxide ( $MgO$ ) oplosbaar in water (66 g/l)
- 2,3% Zink (Zn) als fosfaat, oplosbaar in water (30 g/l)



## PFC 1 (C)(I)(b)(ii):

Engrais liquide inorganique avec macronutriments  
à base d'une solution

## Description de l'engrais:

Engrais PK(Mg) avec micronutriments 29,3-5 (+5,1)

## Composition

- 29,3% Anhydride phosphorique total total ( $P_2O_5$ ) soluble dans l'eau et citrate d'ammonium neutre (380 g/l)
- 5,0% Oxyde de potassium ( $K_2O$ ) soluble dans l'eau (65 g/l)
- 5,1% Oxyde de magnésium ( $MgO$ ) soluble dans l'eau (66 g/l)
- 2,3% Zinc (Zn) sous forme de phosphate, soluble dans l'eau (30 g/l)

Inh. **10L** e (15,0 kg)





### Advies

| Gewas                                    | Tijdstip van toediening                                                  | Dosering        | Opmerkingen                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Algemeen                                 | Vanaf opkomst/<br>snelle begroei                                         | 3-5<br>liter/ha | Let op met mengen<br>met andere meststoffen |
| Fruiteelt                                | 4-8 bespuitingen in de periode<br>juni en juli,<br>interval 10-14 dagen  | 5<br>liter/ha   | Let op met mengen<br>met andere meststoffen |
| Fruiteelt                                | 3-4 bespuitingen<br>tijdens knolzetting,<br>interval 10-14 dagen         | 4-5<br>liter/ha | Let op met mengen<br>met andere meststoffen |
| Granen                                   | 1-2 bespuitingen<br>vanaf start uitstoeiing,<br>interval 5-10 dagen      | 5-7<br>liter/ha | Let op met mengen<br>met andere meststoffen |
| Mais, uien,<br>peen, overige<br>gewassen | 1-3 bespuitingen vanaf<br>2-3 weken na opkomst<br>(voldoende bladopname) | 3-5<br>liter/ha | Let op met mengen<br>met andere meststoffen |



### Conseils

| Culture                                        | Moment d'administration                                                                                           | Dosage           | Commentaires                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Généralités                                    | Dès la croissance / le début<br>de la croissance rapide                                                           | 3-5<br>litres/ha | Attention aux mélanges<br>avec d'autres engrais |
| Culture<br>fruitière                           | 4-8 pulvérisations en<br>juin et juillet, à 10-14 jours<br>d'intervalle                                           | 5<br>litre/ha    | Attention aux mélanges<br>avec d'autres engrais |
| Culture<br>fruitière                           | 3-4 pulvérisations pendant<br>la formation des tubercules,<br>à 10-14 jours d'intervalle                          | 4-5<br>litres/ha | Attention aux mélanges<br>avec d'autres engrais |
| Céréales                                       | 1-2 pulvérisations dès<br>le début de la germination,<br>à 5-10 jours d'intervalle                                | 5-7<br>litres/ha | Attention aux mélanges<br>avec d'autres engrais |
| Mais, oignons,<br>carottes,<br>autres cultures | 1-3 pulvérisations à partir<br>de 2-3 semaines après la<br>croissance (absorption<br>suffisante par les feuilles) | 5-7<br>litres/ha | Attention aux mélanges<br>avec d'autres engrais |

#### Bestanddelen

- Magnesium di-waterstoforthofosfaat<sup>1</sup> (CAS:13092-66-5)
- Kalium di-waterstoforthofosfaat<sup>1</sup> (CAS:7778-77-0)
- Zink di-waterstoforthofosfaat<sup>1</sup> (CAS:13598-37-3)
- Orthofoforzuur<sup>1</sup> (CAS:7664-38-2)

<sup>1</sup> CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

#### Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming
- Niet mengen met koper en sterk alkalische producten
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen

#### Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking

#### Veiligheidsaanbevelingen

- P101: Buiten het bereik van kinderen houden
- P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
- P273: Voorkom lozing in het milieu
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker

#### Gevarenaanduidingen

- H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### Composants

- Dihydrogënofosfaat de magnësiüm<sup>1</sup> (CAS:13092-66-5)
- Dihydrogënofosfaat de potassiüm<sup>1</sup> (CAS:7778-77-0)
- Dihydrogënofosfaat de zink<sup>1</sup> (CAS:13598-37-3)
- Acide ortho-phosphorique<sup>1</sup> (CAS:7664-38-2)

<sup>1</sup> CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

#### Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires
- Ne pas mélanger avec du cuivre et des produits fortement alcalins
- À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu
- Ne pas dépasser les quantités requises
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques

#### Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets

#### Recommandations de sécurité

- P101: Tenir hors de portée des enfants
- P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
- P273: Éviter les rejets dans l'environnement
- P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets

#### Mentions de danger

- H412: Nocif pour les organismes aquatiques, avec des conséquences durables



groeï door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5  
NL-4424 NC Wemeldinge  
Tel: +31 (0)113 629 000  
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Tradecorp International, Parque Empresarial Cristalia - Edificio ONIC 5, 6ª planta Via de los Poblados 3 28033 Madrid (SP)  
(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



www.agrirecover.eu