

GOED  
SCHUDDEN  
VOOR  
GEBRUIKBIEN  
AGITER  
AVANT  
L'EMPLOIBLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE

# Folioplus

# Mangaannitraat

**PFC 1 (C)(II)(a):**

Enklevoudige anorganische micronutriëntenmeststof

**PFC 1 (C)(II)(a):**

Engrais inorganique simple à oligo-élément

## Samenstelling

**13,5% Mangan (Mn)**

oplosbaar in water (200 g/l)

**6,7% Nitraatstikstof (NO<sub>3</sub>-N)**

oplosbaar in water (100 g/l)

## Composition

**13,5% Manganèse (Mn)**

soluble dans l'eau (200 g/l)

**6,7% Azote nitrique (NO<sub>3</sub>-N)**

soluble dans l'eau (100 g/l)

Inh. **10L** e (14,8 kg)

CE

# Foliplus

## Mangaannitraat



### Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen	Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Algemeen	Voor snel herstel van gebrek	0,25-1 liter/ha	Herhaling vaak nodig	Généralités	Pour une réparation rapide des dommages	0,25-1,0 litres/ha	Répétition fréquente nécessaire
Aardappelen	Preventief: wekelijks v anaf knolzetting Curatief: 3x sputten met interval 1 week	0,25-0,5 liter/ha 1 liter/ha	6-8 maal per seizoen, mengbaar met fungiciden Minimaal 200 liter water	Pommes de terre	Préventif : hebdomadaire à partir de la formation des tubercules Curatif : 3x pulvérisations avec intervalle 1 semaine	0,25-0,5 litres/ha 1 litres/ha	6-8 fois par saison, miscible avec fongicides Au moins 200 litres d'eau
Lelie/Tulp	Preventief: wekelijks vanaf 1 week na opkomst	0,25-0,5 liter/ha	Minimaal 200 liter water	Lys/tulipes	Préventif : hebdomadaire à partir de 1 semaine après croissance	0,25-0,5 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau
Fruitbomen	Vanaf ca. 2 weken voor de bloei, de eerste ca. 6 weken na de bloei en ca. 4 weken voor de oogst	0,25-0,75 liter/ha	Minimaal 200 liter water bij voorkeur niet toepassen in de bloei	Arbres fruitiers	À partir d'environ 2 semaines avant la floraison, environ les 6 premières semaines après la floraison et environ 4 semaines avant la récolte	0,25-0,75 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau ne pas appliquer lors de la floraison
Overige gewassen	Bij ernstig gebrek: 3x sputten met interval 1 week	1 liter/ha	Minimaal 200 liter water	Autres cultures	En cas de carence sérieuse : 3x pulvérisations avec intervalle 1 semaine	1 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau

### Bestanddelen

Mangaannitraat (CAS:10377-66-9)

**CMC 1:** Stoffen en mengsels als primair materiaal

### Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet sputten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

### Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed gevентileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

### Veiligheidsaanbevelingen

- P261:** Stoof/rook/gas/nevel/damp/puitnevel niet inademen.  
**P280:** Beschermende kleding dragen.  
**P301+P312:** NA INSLUKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/-raadplegen.  
**P301+P330+P331:** NA INSLUKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.  
**P304+P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  
**P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

### Gevarenaanduidingen

- H302:** Schadelijk bij inslikken.  
**H314:** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
**H373:** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.



### Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Généralités	Pour une réparation rapide des dommages	0,25-1,0 litres/ha	Répétition fréquente nécessaire
Pommes de terre	Préventif : hebdomadaire à partir de la formation des tubercules	0,25-0,5 litres/ha	6-8 fois par saison, miscible avec fongicides
Lys/tulipes	Curatif : 3x pulvérisations avec intervalle 1 semaine	1 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau
Arbres fruitiers	À partir d'environ 2 semaines avant la floraison, environ les 6 premières semaines après la floraison et environ 4 semaines avant la récolte	0,25-0,75 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau
Autres cultures	En cas de carence sérieuse : 3x pulvérisations avec intervalle 1 semaine	1 litres/ha	Au moins 200 litres d'eau

### Recommendations de sécurité

Nitrate de manganezen (CAS:10377-66-9)  
**CMC 1:** Substances et mélanges en tant que matière première

### Mélangeabilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contactez le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

### Conditions de stockage

- Conserver les engrains foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

### Recommandations de sécurité

**P261:** Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
**P280:** Porter des vêtements de protection.

**P301+P312:** APRÈS INGESTION : Si vous vous sentez mal, consultez un CENTRE ANTIPOISON/docteur/etc.

**P301+P330+P331:** EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P304+P340:** EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer.

### Mentions de danger

**H302:** Nocif en cas d'ingestion.

**H314:** Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

**H373:** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)

groei door kennis

CropSolutions  
Oostelijke Kanaalweg 5  
NL-4424 NC Wemeldinge  
Tel: +31 (0)11 629 000  
[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)



Gevaar  
Danger