



BLADMESTSTOF
ENGRAIS FOLIAIRE



Foliplus Supremo



PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Samengestelde vloeibare anorganische macro-
nutriëntenmeststof op basis van een suspensie

Omschrijving meststof:

N (Ca, Mg) meststof met micronutriënten, 4,6-0-0 (+8,2 +7,6)

Samenstelling

- 4,6% Totaal Stikstof (N) (70 g/l),
- 4,6% Ureumstikstof ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$)
- 8,2% Calciumoxide (CaO) oplosbaar in water (126 g/l)
- 7,6% Mag nesiumoxide (MgO) oplosbaar in water (140 g/l)
- 4,0% Boor (B) oplosbaar in water (61 g/l)
- 4,6% Mangaan (Mn) oplosbaar in water (71 g/l)
- 0,25% Molybdeen (Mo) oplosbaar in water (4 g/l)

Deze meststof bevat ureum dat ammoniak kan uitstoten en
de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale
omstandigheden moeten passende herstelmaatregelen
worden genomen.

Vol. **10L** e (15,3 kg)



PFC 1 (C)(I)(b)(i) :

Engrais liquide inorganique avec macro-
nutriments sous forme de suspension

Description engrais :

Engrais N (Ca, Mg) avec micronutriments, 4,6-0-0 (+8,2 +7,6)

Composition

- 4,6% Azote total (N) (70 g/l),
- 4,6% Azote uréique ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$)
- 8,2% Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau (126 g/l)
- 7,6% Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau (140 g/l)
- 4,0% Bore (B) soluble dans l'eau (61 g/l)
- 4,6% Manganèse (Mn) soluble dans l'eau (71 g/l)
- 0,25% Molybdène (Mo) soluble dans l'eau (4 g/l)

Cet engrais contient de l'urée, qui peut émettre de l'ammoniac
et affecter la qualité de l'air. En fonction des conditions locales,
des mesures correctives appropriées doivent être prises.



Folioplus[®] Supremo



Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen
Suikerbiet	Vanaf 4-6 blad stadium	3 liter /ha	
Alle Koolsoorten	Vanaf 4-6 blad stadium, interval 14 dagen	3 liter/ha	
Koolzaad	Bij snelle loof- en stengelgroei, interval 14 dagen	3-4 liter/ha	Niet in de bloei spuiten
Fruit		2-4 liter/ha	

Bestanddelen

Colemanite¹ (CAS: 1318-33-8)

Magnesium Hydroxide¹ (CAS: 1309-42-8)

Mangaancarbonaat¹ (CAS: 598-62-9)

Ureum¹ (CAS: 57-13-6)

¹ CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5 en 25 °C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

Opslagomstandigheden

- Folioplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren tussen 5 en 25 °C op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsaanbevelingen

- P264:** Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P280:** Beschermende kledij dragen.
- P302+P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501:** Inhoud en verpakking afvoeren naar erkende afvalverwerker.

Gevarenaanduidingen

- H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315:** Veroorzaakt huidirritatie.



Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Betterave sucrière	À partir du stade 4-6 feuilles	3 litres/ha	
Tous les types de choux	À partir du stade 4-6 feuilles, intervalle de 14 jours	3 litres/ha	
Colza	En cas de croissance rapide du feuillage et de la tige, intervalle de 14 jours	3-4 litres/ha	Ne pas pulvériser pendant la floraison
Fruits		2-4 litres/ha	

Composants

Colemanite¹ (CAS: 1318-33-8)

Hydroxyde de magnésium¹ (CAS: 1309-42-8)

Carbonate de manganèse¹ (CAS: 598-62-9)

Urée¹ (CAS: 57-13-6)

¹ CMC 1: Substances et mélanges en tant que matière première

Miscibilité et application

- Mélangeable avec la plupart des types d'engrais et produits phytosanitaires.
- A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.
- Ne pas dépasser les quantités requises.
- En cas de doute, d'abord effectuer un test de mélange.
- Application optimale sur les feuilles sèches avec des températures comprises entre 5 et 25 °C.
- Ne pas pulvériser si des précipitations sont prévues.
- Contacter le revendeur CropSolutions pour obtenir des conseils spécifiques.

Conditions de stockage

- Conserver les engrais foliaires Folioplus à l'abri du gel entre 5 et 25 °C dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

Recommandations de sécurité

- P264:** Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit.
- P280:** Porter des vêtements de protection.
- P302+P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon
- P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles de contact, si possible ; continuer à rincer.
- P501:** Éliminer le contenu/récipient dans ...

Mentions de danger

- H319:** Provoque une grave irritation des yeux.
- H315:** Provoque une irritation cutanée.



groei door kennis

CropSolutions

Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tél. : +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.eu

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Omex Agrifluids, Saddlebow Rd, King's Lynn, Norfolk, PE34 3JA (UK)
Importeur: CropSolutions, Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC Wemeldinge (NL)



www.agrirecover.eu



Warning
Waarschuwing