

BLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE

# Folioplus Zwavel



## PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Enkelvoudige vloeibare anorganische macro-nutriëntenmeststof op basis van een suspensie

## Omschrijving meststof:

S meststof, 115

## Samenstelling

115,4% Zwaveltrioxide ( $\text{SO}_3$ ) (1500 g/l)

Toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw volgens EU 2021/1165



## PFC 1 (C)(I)(b)(i):

Engrais liquide inorganique simple à macronutriments et micronutriments à base d'une suspension

## Description engrais:

Engrais S, 115

## Composition

115,4% Azote nitrique ( $\text{SO}_3$ ) (1500 g/l)

Autorisé pour une utilisation dans l'agriculture biologique selon l'UE 2021/1165

Inh. 10L e (13,0 kg)



# Foliplus

## Zwavel



groei door kennis

**CropSolutions**  
Oostelijke Kanaalweg 5  
NL-4424 NC Wemeldinge  
Tel: +31 (0)113 629 000  
[www.cropsolutions.eu](http://www.cropsolutions.eu)

## Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen	Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Algemeen	Bij (verwacht) gebrek	3-10 liter/ha		Généralités	En cas de carence (prévue)	3-10 litres/ha	1 à 3 applications, à 10-15 jours d'intervalle
Granen, mais, koolzaad, preventief	Vanaf opkomst tot begin strekking	3-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen	Céréales, maïs, colza, préventif	Dès la croissance jusqu'au début du développement	3-5 litres/ha	
Granen, mais, koolzaad, curatief	Bij zichtbaar gebrek	5-10 liter/ha	In min 250 liter water	Céréales, maïs, colza, curatif	En cas de carence visible	5-10 litres/ha	Dans au moins 250 litres d'eau
Overige breedbladigen, fruit	Bij verwacht zwavelgebrek, in het vroege voorjaar, voldoende bladopname moet mogelijk zijn	2-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen in min 250 liter water, niet mengen met olie	Autres fruits, à feuilles larges	En cas de carence prévue en soufre, au début du printemps, une absorption suffisante par les feuilles devrait être possible	2-5 litres/ha	1-3 applications, à 10-15 jours d'intervalle dans au moins 250 litres d'eau, ne pas mélanger avec de l'eau

### Bestanddelen

Zwavel suspenzie<sup>1</sup> (CAS: 7704-34-9)

<sup>1</sup> CMC 1: Stoffen en mengsels als primair materiaal

### Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Aleent te gebruiken in geval van erkende behoeftte.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

### Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

### Veiligheidsaanbevelingen

- P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
 P280: Beschermende kledij dragen.  
 P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
 P321: Specifieke behandeling vereist.  
 P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.  
 P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken. en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### Gevarenaanduidingen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

## Conseil

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen	Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Algemeen	Bij (verwacht) gebrek	3-10 liter/ha		Généralités	En cas de carence (prévue)	3-10 litres/ha	1 à 3 applications, à 10-15 jours d'intervalle
Granen, mais, koolzaad, preventief	Vanaf opkomst tot begin strekking	3-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen	Céréales, maïs, colza, préventif	Dès la croissance jusqu'au début du développement	3-5 litres/ha	
Granen, mais, koolzaad, curatief	Bij zichtbaar gebrek	5-10 liter/ha	In min 250 liter water	Céréales, maïs, colza, curatif	En cas de carence visible	5-10 litres/ha	Dans au moins 250 litres d'eau
Overige breedbladigen, fruit	Bij verwacht zwavelgebrek, in het vroege voorjaar, voldoende bladopname moet mogelijk zijn	2-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen in min 250 liter water, niet mengen met olie	Autres fruits, à feuilles larges	En cas de carence prévue en soufre, au début du printemps, une absorption suffisante par les feuilles devrait être possible	2-5 litres/ha	1-3 applications, à 10-15 jours d'intervalle dans au moins 250 litres d'eau, ne pas mélanger avec de l'eau

### Conditions de stockage

- Conserver les engrains foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

### Recommendations de sécurité

P264: Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit.

P280: Porter des vêtements de protection.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P321: Traitement spécifique requis.

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362+P364: Enlever les vêtements contaminés et laver avant de réutiliser.

### Mentions de danger

H315: Provoque une irritation cutanée.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

(her)verpakt door: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



Warning  
Waarschuwing