

GOED  
SCHUDDEN  
VOOR  
GEBRUIKBIEN  
AGITER  
AVANT  
L'EMPLOIBLADMESTSTOF  
ENGRAIS FOLIAIRE

*Vernieuwde  
samenstelling  
Nouvelle  
composition*

# Folioplus

# Zwavel Xtra

**PFC 7: Bemestingsproductenblend**

Enkelvoudige vloeibare anorganische macronutriënten-meststof op basis van een suspensie

**Omschrijving meststof:**

S meststof (84,5) met micronutrienten

**UFI code:** A2UU-KUCF-V00H-S2W6**Samenstelling**84,5% Zwaveltrioxide ( $\text{SO}_3$ )  
oplosbaar in water (1360 g/l)1,9% Koper (Cu) als oxychloride,  
oplosbaar in water (30 g/l)8,0% Mangaan (Mn) als carbonaat,  
oplosbaar in water (125 g/l)1,3% Zink (Zn) als oxide,  
oplosbaar in water (20 g/l)**UN code**  
**Code UN** 3082

Inh. 10L e (16,1 kg)

**PFC 7: Combinaison de fertilisants**

Engrais liquide inorganique simple à macronutriments et micronutriments à base d'une suspension

**Description de l'engrais:**

Engrais S (84,5) avec micronutriments

**Code UFI:** A2UU-KUCF-V00H-S2W6**Composition**84,5% Azote nitrique ( $\text{SO}_3$ )  
soluble dans l'eau (1360 g/l)1,9% Cuivre (Cu) comme oxychlorure,  
soluble dans l'eau (30 g/l)8,0% Manganèse (Mn) comme carbonate,  
soluble dans l'eau (125 g/l)1,3% Zinc (Zn) comme oxyde,  
soluble dans l'eau (20 g/l)

CE

# Foliplus

## Zwavel Xtra



### Advies

Gewas	Tijdstip van toediening	Dosering	Opmerkingen	Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Algemeen	Bij (verwacht) gebrek	3-10 liter/ha		Généralités	En cas de carence (prévue)	3-10 litres/ha	
Granen, mais, koolzaad, preventief	Vanaf opkomst tot begin strekking	3-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen	Céréales, mais, colza, préventif	Dès la croissance jusqu'au début du développement	3-5 litres/ha	1 à 3 applications, à 10-15 jours d'intervalle
Granen, mais, koolzaad, curatief	Bij zichtbaar gebrek	5-10 liter/ha	In min. 250 liter water	Céréales, mais, colza, curatif	En cas de carence visible	5-10 litres/ha	Dans au moins 250 litres d'eau
Overige breedbladigen, fruit	Bij verwacht zwavel- gebrek, in het vroege voorjaar, voldoende bladopname moet mogelijk zijn	2-5 liter/ha	1-3 bespuitingen, interval 10-15 dagen in min. 250 liter water, niet mengen met olie	Autres fruits, à feuilles larges	En cas de carence prévue en soufre, au début du printemps, une absorption suffisante par les feuilles devrait être possible	2-5 litres/ha	1-3 applications, à 10-15 jours d'intervalle dans au moins 250 litres d'eau, ne pas mélanger avec de l'eau

### Bestanddelen

Zwavel suspenzie<sup>1</sup> (CAS: 7704-34-9)

Mangaancarbonaat<sup>1</sup> (CAS: 598-62-9)

<sup>1</sup> CMC 1: Stoffen en mengsels als primaire materiaal

### Mengbaarheid en toepassing

- Mengbaar met de meeste soorten meststoffen en gewasbescherming.
- Bij twijfel eerst een mengproef uitvoeren.
- Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefté.
- De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.
- Optimale toepassing op droog blad met temperaturen tussen 5°C en 25°C.
- Niet spuiten wanneer kort erop regen wordt verwacht.
- Neem contact op met de CropSolutions dealer voor specifieke aanbevelingen.

### Opslagomstandigheden

- Foliplus bladmeststoffen vorstvrij bewaren op een goed geventileerde, koele, droge plaats
- Bewaar het product in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking.
- Lege verpakking afvoeren conform wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

### Veiligheidsaanbevelingen

- P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.  
 P280: Beschermende kledij dragen.  
 P391: Gelekte/gemorstte stof opruimen.

### Gevaarenaanduidingen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



### Conseil

Culture	Moment d'administration	Dosage	Commentaires
Généralités	En cas de carence (prévue)	3-10 litres/ha	
Céréales, mais, colza, préventif	Dès la croissance jusqu'au début du développement	3-5 litres/ha	
Céréales, mais, colza, curatif	En cas de carence visible	5-10 litres/ha	Dans au moins 250 litres d'eau
Autres fruits, à feuilles larges	En cas de carence prévue en soufre, au début du printemps, une absorption suffisante par les feuilles devrait être possible	2-5 litres/ha	1-3 applications, à 10-15 jours d'intervalle dans au moins 250 litres d'eau, ne pas mélanger avec de l'eau

### Conditions de stockage

- Conserver les engrains foliaires Foliplus à l'abri du gel dans un endroit bien ventilé, frais et sec.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé.
- Éliminer les emballages vides conformément aux dispositions légales relatives à l'élimination des déchets.

### Recommendations de sécurité

P264: Laver ... soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P391: Recueillir le produit répandu.

### Mentions de danger

H315: Provoque une irritation cutanée.

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Batchno.

Productiedatum

Vervaldatum: 3 jaar na productiedatum

Producent: Biron, De Vecht 5, 8253 PH Dronten (NL)



www.agrirecover.eu



Warning  
Waarschuwing