

Zaaizaadhoeveelheid

FarmPlus onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- De zwaarte van de grond
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%

Bestellen

U kunt uw zaagranen eenvoudig bestellen in de Bestelapp, op de website in **Mijn Heyboer**, via info@heyboerbv.com, telefonisch of bij uw teeltspecialist.



T 0321 33 50 33 – www.farmplus.nl

© CS - 09.25

CropSeeds Wintertarwe Midden-Nederland

OOGST
2026



*“Altijd het juiste
tarweras voor
mijn bedrijf.”*

Teler Anne



groeï door kennis

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld uw grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormen een belangrijk criterium, houd hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roest resistenties.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.
- Niet genoemde rassen kunnen (mits voorradig) in overleg worden geleverd.

Wintertarweadvies FarmPlus Midden oogst 2026



		Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 		Kingkong	Extase	Tomjol
Maaltarwe 		Cubitus Shamal Olaf Chevignon	Lamant Eruptium	
Voertarwe 			Marlin Keitum	Champion

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Adviseur Wouter



groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Korrelopbrengsten

Overzicht van gemiddelde resultaten 2020 t/m 2025

Rasnaam	Segment	Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Extase 		98	98	97	100	98	98
Kreuzer 		97	99	101	101	100	101
Stanwix 		98	99	97	95	98	97
Revolution 		104	101	98	103	100	100
Intensity 		103	100	103	101	100	98
Kingkong 		107	105	109	102	99	101
Rebellion 		98	97	102	105	101	103
Garfield 		99	97	97	99	95	97
Informer 		89	93	91	93	96	95
Calgary 		93	93	96	96	95	96
Gambit 		96	92	92	96	97	96
Eruptium 		103	105	105	103	101	99
Shamal 		100	104	106	100	102	105
Olaf 		109	106	106	103	102	101
Shrek 		106	108	104	104	102	100
Lamant 		110	112	107	106	106	106
Marlin 		96	98	96	101	102	98
Hemingway 		104	104	102	103	100	101
Patrick 		99	105	106	99	105	104
Horizon 		102	104	103	105	103	103
Winner 		97	102	101	106	105	97
Fairview 		103	102	103	104	100	102
Positiv 		101	96	101	103	102	100
Spearhead 		97	97	100	97	99	103
Champion		94	96	95	103	104	104
Gleam		93	90	93	93	92	97
Twee jaar onderzocht							
Tomjol		106	111	111	106	107	107
100 = ...ton/ha		11,3	10,8	10,2	12,3	11,9	11,2

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2025

Raseigenschappen (2022-2025)

In onderstaande tabel een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per winterarwasras.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoliter gewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekken-ziekte	Fusarium in de aar	
Extase		96	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,5	7,5	80	6,5	101
Tomjol		105	8,5	7,5	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	8,0	104
Kingkong		98	7,5	8,0	8,0	6,0	9,0	8,0	9,0	7,5	6,5	102
Calgary		98	7,5	7,5	6,5	6,0	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	99
Chevignon*		98	7,5	8,0	7,5	6,5	8,0	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Cubitus*		96	8,0	8,0	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0	8,0	6,5	103
Erruptium		98	7,5	7,5	7,0	5,5	9,0	8,0	7,5	8,0	7,0	102
Shamal		100	6,0	8,5	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	100
Lamant		108	8,0	7,5	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	101
Olaf		98	7,5	8,5	8,0	5,5	8,5	8,0	6,5	8,0	7,5	103
Marlin		111	8,5	7,5	7,0	6,5	8,5	7,0	7,5	7,5	7,5	101
Residence*		102	6,0	7,5	7,5	5,5	9,0	7,5	8,0	6,5	7,0	101
Champion		94	8,0	6,0	6,0	6,0	9,0	5,0	7,5	7,5	6,5	95
Keitum**		100	8,0	7,0	6,0	6,5	7,5	7,0	9,0	7,0	7,0	100

100 = 86 cm

* staat niet (meer) op de CSAR-rassenlijst vermelde raseigenschappen op basis van informatie van historie, kwekers en praktijk
** resistent tegen aantasting van oranje tarwegalmug

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Aanbevolen rassen

Extase

- Baktarwe
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig

Lamant **Nieuw**

- Maaltarwe
- Hoge opbrengst
- Sterke ziekteresistenties
- Zowel vroege als late zaai

Kingkong **Nieuw**

- Baktarwe
- Vroeg ras
- Sterke ziekteresistenties
- Geschikt voor zand en klei

Olaf **Nieuw**

- Maaltarwe
- Hoog hectoliter gewicht
- Zeer vroeg ras
- Gezond ras
- Kleigrond

Erruptium

- Maaltarwe
- Zeer gezond
- Hoge opbrengst
- Stevig middenlang stro
- Midden vroege afrijping

Tomjol **Nieuw**

- Baktarwe
- Hoge opbrengst
- Hoog hectoliter gewicht
- Sterke ziekteresistenties

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.

Slakkenbeheersing

We zien ondanks de droogte, de afgelopen jaren een toename van het slakkenprobleem. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaai-bed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De slakkenkorrels zijn op basis van de werkbare stof ijzer(III)-fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk.



groe door kennis

www.cropsolutions.eu