

Zaaizaadhoeveelheid

FarmPlus onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m² nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m² na de winter overgebleven zijn.

De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- De zwaarte van de grond
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%




T 0113 62 90 00 – www.farmplus.nl

© CS - 09.25

CropSeeds Wintertarwe Zuid-Nederland

OOGST
2026



*“Altijd het juiste
tarweras voor
mijn bedrijf.”*

Teler Anne



groei door kennis

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld je grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormen een belangrijk criterium, houdt hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roest resistenties.
- De markt vraagt steeds meer om kwalitatief goede Nederlandse tarwe. We weten dat het ras en een goed eiwitgehalte van groot belang is. FarmPlus betaald op baktarwe met een eiwit percentage boven de 11% een oplopende premie.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- Maal- en baktarwerassen zijn stabiel in opbrengst over de jaren heen en houden het teeltrendement hoog. Deze hebben ook afgelopen jaar de hoogste hectolitergewichten laten zien.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Wintertarweadvies FarmPlus oogst 2026



	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe 	Addiction Kingkong	Reform Extase	Stanwix Tomjol
Maaltarwe 	Cubitus Chevignon Olaf	Calgary	
Voertarwe 	Shamal	Lamant	Champion

“Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.”

Adviseur Wouter

Resultaten proefvelden 2025

FarmPlus heeft op drie locaties binnen haar werkgebied proefvelden met wintertarwe aangelegd. Op deze velden testen we de huidige rassen op kwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Naast de huidige rassen worden ook nieuwe rassen, die het in onze buurlanden goed doen, uitgezaaid om te beoordelen of ze ook voor onze teeltomstandigheden geschikt zijn. Kwaliteit en gezondheid zijn een belangrijke pijlers in de selectie van rassen. Hieronder in de tabel zijn de resultaten weergegeven van de proefvelden van oogst 2025. In de laatste kolom is, zover van toepassing, de opbrengst van de Rassenlijst Zuidwest-Nederland van het jaar 2025 opgenomen.

Rasnaam	Segment	Westmaas	Rusthoeve	Z-VL	HL (2025)	Gewogen gemiddelde 2025	Gemiddelde over jaren	Jaren onderzoek	CSAR 2026 ZW
Reform		97	96	92	82	96	96	5	–
Extase		101	100	99	81	100	101	5	98
Addiction		98	104	104	80	101	103	4	–
Tomjol		100	99	–	82	99	107	2	107
Kingkong		101	103	–	82	102	102	1	101
Stanwix		96	93	91	81	95	96	2	97
Chevignon		101	98	113	80	102	100	5	–
Calgary		97	103	105	78	100	99	5	96
Olaf		97	95	–	82	96	96	1	101
Cubitus		–	–	–	–	–	99	4	–
Champion		107	100	97	74	103	104	3	104
Shamal		111	107	99	79	108	106	4	105
Lamant		104	103	100	78	103	108	2	106

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Raseigenschappen (2022-2025)

In onderstaande tabel een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per wintertarweras.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectoliter gewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekken-ziekte	Fusarium in de aar	
Addiction ^{*/**}		97	7,5	8,0	8,0	7,0	7,5	6,0	8,0	7,0	6,0	104
Reform [*]		99	8,0	6,0	7,0	7,0	6,5	7,5	8,0	7,0	7,0	105
Extase		96	8,0	8,0	7,0	7,0	8,0	7,5	7,5	8,0	6,5	101
Tomjol		105	8,5	7,5	6,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,5	8,0	104
Kingkong		98	7,5	8,0	8,0	6,0	9,0	8,0	9,0	7,5	6,5	102
Stanwix		102	8,0	6,0	6,0	7,0	9,0	7,5	8,5	7,5	7,5	102
Calgary		98	7,5	7,5	6,5	6,0	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	99
Chevignon [*]		98	7,5	8,0	7,5	6,5	8,0	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Cubitus [*]		96	8,0	8,0	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0	8,0	6,5	103
Olaf		98	7,5	8,5	8,0	5,5	8,5	8,0	6,5	8,0	7,5	103
Residence [*]		102	6,0	7,5	7,5	5,5	9,0	7,5	8,0	6,5	7,0	101
Champion		94	8,0	6,0	6,0	6,0	9,0	5,0	7,5	7,5	6,5	95
Shamal		100	6,0	8,5	7,5	7,0	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	100
Lamant		108	8,0	7,5	6,5	7,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,0	101

100 = 86 cm

* staat niet (meer) op de CSAR-rassenlijst vermelde raseigenschappen op basis van informatie van historie, kwekers en praktijk

** resistent tegen aantasting van oranje tarwegalmug

 Baktarwe  Maaltarwe  Voertarwe

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Aanbevolen rassen

Extase

- Baktarwe
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig

Chevignon

- Maaltarwe
- Vroeg ras
- Weinig ziektegevoelig
- Grootste ras Noordwest-Europa

Addicton

- Baktarwe
- Vroegrijp ras
- Resistentie tegen oranje galmug

Olaf

- Maaltarwe
- Hoog hectoliter gewicht
- Zeer vroeg ras
- Gezond ras

Calgary

- Maaltarwe
- Middenvroeg ras
- Zeer gezond
- Ook geschikt voor lichtere gronden

Tomjol

- Baktarwe
- Hoge opbrengst
- Hoog hectoliter gewicht
- Sterke ziekteresistenties

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:

- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.

