Zaaizaadhoeveelheid

FarmPlus onderzoekt alle teeltmaatregelen die nodig zijn om een hogere opbrengst te behalen. Uit langjarig onderzoek blijkt dat voor bovengemiddelde opbrengsten minimaal 700 aren per m^2 nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er minimaal 300 planten per m^2 na de winter overgebleven zijn.

De zaaihoeveelheid is afhankelijk van de volgende criteria:

- Het zaaimoment
- De zwaarte van de grond
- Het duizendkorrelgewicht (DKG)
- De zaaiomstandigheden

Tabel geeft ons advies weer om tot voldoende planten in het voorjaar te komen:

Zaaimoment	Duizendkorrelgewicht (DKG)				Zaaiomstandigheden	
	40	45	50	55	Goed/ lichte grond	Slecht/ zware grond
Eerste helft oktober	130	145	160	175	0%	+10%
Tweede helft oktober	145	170	180	200	0%	+10%
Eerste helft november	165	185	205	225	-5%	+5%
Tweede helft november	180	200	225	245	-5%	+5%
Eerste helft december	195	220	240	265	-5%	0%
Tweede helft december	200	225	250	275	-5%	0%

Bestellen

U kunt uw zaaigranen eenvoudig bestellen in de Bestelapp, op de website in **Mijn FarmPlus**, via **verkoopnoord@farmplus.nl**, telefonisch of bij uw teeltspecialist.

Crop© Solutions.eu
groei door kennis

FARMPLUS
T 088 99 00 713 – www.farmplus.nl

© CS - 09.26

CropSeeds Wintertarwe

Noordwest-Nederland

OOGST 2027



FARMPLUS

Crop© Solutions.eu
groei door kennis

Rassenkeuze

Het juiste tarweras zaaien is de sleutel tot succes om een goede opbrengst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan opbrengsteigenschappen, maar stem het ook af op bijvoorbeeld uw grondsoort. Hierbij een aantal aandachtspunten ter ondersteuning van uw rassenkeuze:

- De resistentie van rassen tegen ziekten, met name aarfusarium, vormen een belangrijk criterium, houd hier rekening mee in de rassenkeuze.
- Er komen steeds sneller nieuwe fysio's van gele, maar ook bruine roest. Kies een ras met een hoog cijfer voor roest resistenties.
- Niet alle vroege rassen zijn geschikt voor late zaai. Zaai late rassen bij voorkeur vroeg, zodat ze alsnog op tijd rijp zijn.
- FarmPlus adviseert om een ras te kiezen waar minstens 3 jaar onderzoek naar gedaan is.

Wintertarweadvies FarmPlus Noordwest oogst 2027

	Vroeg	Midden	Laat
Baktarwe	Kingkong	Extase	Tomjol
Maaltarwe	Olaf	Erruptium	
Voertarwe	Majesko Shamal	Lamant Keitum Patrick	Champion



"Het juiste tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst."

Adviseur Wouter

Crop© Solutions.eu

groei door kennis

www.cropsolutions.eu

Korrelopbrengsten

Overzicht van gemiddelde resultaten 2021 t/m 2026

Rasnaam	Segment	Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
KWS Extase		**96**	**95**	**94**	**98**	**96**	**96**
SY Revolution		101	98	96	100	98	100
Intensity		101	96	99	99	97	98
Kingkong		**104**	**102**	**105**	**100**	**98**	**101**
WPB Fairview		102	99	99	101	99	99
Allsome		101	101	103	99	97	100
LG Tomjol		**104**	**107**	**108**	**104**	**106**	**106**
Garfield		96	93	94	96	93	96
WPB Calgary		91	89	93	93	93	95
Olaf		**105**	**103**	**103**	**101**	**101**	**100**
Shrek		103	104	103	101	100	100
Hemingway		101	101	99	101	98	100
SU Horizon		99	100	100	101	101	102
Winner		97	100	100	103	102	99
KWS Erruptium		**100**	**102**	**102**	**99**	**99**	**97**
SU Shamal		**97**	**101**	**103**	**97**	**101**	**104**
WPB Lamant		**107**	**108**	**105**	**103**	**104**	**105**
Patrick		**98**	**102**	**103**	**98**	**104**	**104**
RGT Majesko		**108**	**109**	**108**	**100**	**100**	**99**
WPB Marlin		**91**	**95**	**92**	**98**	**101**	**97**
Positiv		98	94	97	100	101	100
RGT Bairstow		88	86	90	89	94	97
Spearhead		94	94	98	94	97	102
100 = ...ton/ha		11,4	10,8	10,5	12,6	11,9	11,6

Baktarwe Maaltarwe Voertarwe

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2027

Raseigenschappen (2026-2027)

In onderstaande tabel staat een overzichtelijke weergave van de beoordeling op diverse eigenschappen per wintertarweras. De aanbevolen rassen zijn vetgedrukt.

Rasnaam	Segment	Lengte stro (rel)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen						Hectolitergewicht (rel.)
						Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Aarfusarium	
Allsome		97	8,0	MV	7,5	6,5	9,0	8,0	8,0	8,0	7,5	103
KWS Extase		**96**	**8,0**	**MV**	**7,5**	**7,0**	**80**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**6,5**	**99**
Kingkong		**99**	**7,0**	**V**	**8,0**	**5,5**	**9,0**	**8,0**	**9,0**	**7,5**	**7,0**	**100**
LG Tomjol		**106**	**8,0**	**MV**	**6,5**	**6,5**	**9,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**7,5**	**102**
WPB Calgary		99	7,5	MV	6,5	6,5	9,0	6,5	8,0	7,0	7,0	97
Chevignon**		98	7,5	MV	7,5	6,5	7,5	6,5	7,0	7,5	6,0	102
Olaf		**98**	**7,0**	**V**	**8,0**	**5,5**	**8,5**	**8,0**	**6,5**	**8,0**	**7,5**	**101**
Champion*		**94**	**8,0**	**ML**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**5,0**	**7,5**	**7,5**	**6,5**	**95**
KWS Erruptium		**98**	**7,0**	**MV**	**7,0**	**5,5**	**9,0**	**8,0**	**7,5**	**8,0**	**7,0**	**100**
WPB Lamant		**109**	**8,0**	**MV**	**6,5**	**7,0**	**9,0**	**8,0**	**9,0**	**8,0**	**7,0**	**99**
RGT Majesko		**91**	**7,5**	**V**	**6,5**	**7,0**	**9,0**	**9,0**	**7,5**	**9,0**	**8,0**	**99**
Patrick		**111**	**80**	**MV**	**6,5**	**6,5**	**9,0**	**7,5**	**8,5**	**8,0**	**8,0**	**102**
SU Shamal		**100**	**6,0**	**V**	**7,5**	**70**	**8,0**	**8,5**	**8,5**	**7,5**	**7,0**	**99**

100 = 89 cm

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2027

* op basis van oudere CSAR gegevens

** op basis informatie kwekers en praktijk

Baktarwe Maaltarwe Voertarwe

Aanbevolen rassen

Extase
- Baktarwe
- Zeer gezond
- Middenvroeg ras
- Zeer stevig
- Bekend en betrouwbaar

Lamant
- Voertarwe
- Hoge opbrengst
- Sterke ziekteresistenties
- Zowel vroege als late zaai

Kingkong
- Baktarwe
- Vroeg ras
- Sterke ziekteresistenties
- Geschikt voor zand en klei

Olaf
- Maaltarwe
- Hoog hectoliter gewicht
- Zeer vroeg ras
- Gezond ras
- Kleigrond

Erruptium
- Voertarwe
- Zeer gezond
- Hoge opbrengst
- Stevig middenlang stro
- Midden vroege afrijping

Tomjol
- Baktarwe
- Hoge opbrengst
- Hoog hectoliter gewicht
- Sterke ziekteresistenties

Gerstevergelingsvirus

Gerstevergelingsvirus is een hardnekkig virus dat door bladluizen wordt overgebracht. Vroeg gezaaide tarwe of gerst kan vooral in een relatief warm najaar besmet worden door invliegende bladluizen. Mogelijke maatregelen tegen bladluizen zijn:
- In het najaar een bladluisbestrijding uitvoeren (indien noodzakelijk).
- Beheersen van opslagplanten op graanpercelen.
- Wees alert bij naburige percelen wintergerst, ook als de betreffende wintergerst tolerant is tegen dwergvergelingsvirus.
- Indien de omstandigheden op het veld het toelaten, zaai pas vanaf half oktober.

Slakkenbeheersing

We zien ondanks de droogte, de afgelopen jaren een toename van het slakkenprobleem. Op zware grond is het mogelijk slakken te beheersen door te zorgen voor een fijn zaaibed. Bovendien heeft de vruchtwisseling invloed op tarwe. Ook kunnen er slakkenkorrels worden toegepast. De slakkenkorrels zijn op basis van de werkbare stof ijzer(III)-fosfaat. Voor deze producten geldt een dosering van 7 kg per ha. Strooi de slakkenkorrels bij voorkeur direct na zaai en herhaal indien noodzakelijk.